

Mængde af **Ernæringsdrik / Sondeernæring** der skal tilbydes, hvis der er spist < ½ eller > ½ af måltidet – kostplaner afs. S7

Valg af præparat:

Ernæringsdrik kan udskiftes til sondeernæring og benyt nedenstående skema for mængde

Ernæringsdrik

Fresubin energy fibre DRINK		
¼ flaske Fresubin energy fibre DRINK	50 ml	= 75 kcal
½ flaske Fresubin energy fibre DRINK	100 ml	= 150 kcal
¾ flaske Fresubin energy fibre DRINK	150 ml	= 225 kcal
1 flaske Fresubin energy fibre DRINK	200 ml	= 300 kcal
1½ flaske Fresubin energy fibre DRINK	300 ml	= 450 kcal
1¾ flaske Fresubin energy fibre DRINK	350 ml	= 525 kcal
2 flasker Fresubin energy fibre DRINK	400 ml	= 600 kcal
2½ flasker Fresubin energy fibre DRINK	500 ml	= 750 kcal

Sondeernæring

Fresubin energy fibre			Væskeindhold
Fresubin energy fibre	50 ml	= 75 kcal	= 38 ml
Fresubin energy fibre	100 ml	= 150 kcal	= 76 ml
Fresubin energy fibre	150 ml	= 225 kcal	= 113 ml
Fresubin energy fibre	200 ml	= 300 kcal	= 152 ml
Fresubin energy fibre	300 ml	= 450 kcal	= 228 ml
Fresubin energy fibre	350 ml	= 525 kcal	= 266 ml
Fresubin energy fibre	400 ml	= 600 kcal	= 304 ml
Fresubin energy fibre	500 ml	= 750 kcal	= 380 ml

Mængde af **Ernæringsdrik / Sondeernæring** der skal tilbydes, hvis der er spist < ½ eller > ½ af måltidet – kostplaner afs. S7

Kostplan 800 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 125 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 25 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 75 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 0 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 25 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Kostplan 1000 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 125 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 25 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 75 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 0 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 25 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Mængde af **Ernæringsdrik / Sondeernæring** der skal tilbydes, hvis der er spist < ½ eller > ½ af måltidet – kostplaner afs. S7

Kostplan 1200 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 75 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 25 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Kostplan 1500 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 125 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 125 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 75 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 25 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Mængde af **Ernæringsdrik / Sondeernæring** der skal tilbydes, hvis der er spist < ½ eller > ½ af måltidet – kostplaner afs. S7

Kostplan 1800 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ½ flaske / 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ½ flaske / 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¼ flaske / 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¼ flaske / 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Kostplan 2000 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ½ flaske / 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¼ flaske / 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Mængde af **Ernæringsdrik / Sondeernæring** der skal tilbydes, hvis der er spist < ½ eller > ½ af måltidet – kostplaner afs. S7

Kostplan 2200 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ½ flaske / 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¼ flaske / 50 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Kostplan 2400 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ½ flaske / 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Mængde af **Ernæringsdrik / Sondeernæring** der skal tilbydes, hvis der er spist < ½ eller > ½ af måltidet – kostplaner afs. S7

Kostplan 2600 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ½ flaske / 100 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Kostplan 2800 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Mængde af **Ernæringsdrik / Sondeernæring** der skal tilbydes, hvis der er spist < ½ eller > ½ af måltidet – kostplaner afs. S7

Kostplan 3000 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 2 flasker / 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage ¾ flaske / 150 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 350 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik

Kostplan 3200 kcal	Morgen	Middag	Eftermiddag	Aften	Sen måltid
Der er spist mindre end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 2 flasker / 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Der er spist mere end ½ af måltidet	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1½ flaske / 300 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 1 flaske / 200 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik
Hele måltidet skal erstattes med Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 500 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik	Patienten skal indtage 400 ml Ernæringsdrik. Se skema s. 1 for valg af Ernæringsdrik