RASS vurderes morgen, eftermiddag og før natten.

RASS -4 eller -5 (eller ingen kommunikations muligheder) → **STOP: UV**

RASS mellem - 3 og + 4

1: Er der en **akut ændring i patientens mentale status?**
Har patienten haft svingende mentalstatus/RASS **inden for de sidste 24 timer**?
Er patienten vurderet delirøs **inden for de sidste 24 timer**?
Eller er patienten **intuberet?**

4 x Nej → **CAM-ICU NEG**

Ja

2: Opmærksomhedstest: Enten **S A V E A H A A R T** eller **billedtest**

0 - 2 fejl → **CAM-ICU NEG**

3 eller flere fejl

3: Ændret bevidsthedsniveau = hvad var RASS?

RASS ikke 0 → **CAM-ICU POS**

RASS = 0

4: Uorganiseret tankegang?

1. Vil en sten flyde på vandet? (eller Vil et blad flyde på vandet?)
2. Er der fisk i havet? (eller Er der giraffer i havet?)
3. Vejer et kilo mere end to kilo? (eller Vejer to kilo mere end et kilo?)
4. Kan man bruge en hammer til at slå et søm i med? (eller til at save brænde med?)

+ Kommando:
Sig til patienten: "Hold så mange fingre op" (Du holder to fingre op foran patienten)
"Nu skal du gøre det samme med den anden hånd" (Gentag ikke antallet af fingre).
(Hvis patienten er ude af stand til at bevæge begge arme kan den anden kommando i stedet være: "Tilføj endnu en finger") **Patienten skal kunne udføre hele kommandoen én gang**.

Samlet 0 -1 fejl → **CAM-ICU NEG**

Mindst 2 fejl → **CAM-ICU POS**

Copyright © 2002, E. Wesley Ely, MD, MPH and Vanderbilt University, all rights reserved, Oversat til dansk 2005 af Helle Svenningsen, RN, Aarhus University Hospital, Denmark efter tilladelse