

## Action Card

### Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Brandevej ved mistanke om hjertestop på kontorgang og hjertestop på fællesarealer

Ved mistanke om hjertestop slås alarm i huset:

To personalemedlemmer starter **basal genoplivning** (se bagsiden)

Afsnit S3 bringer hjertestarter (AED)

Afsnit S1 sikrer, at der er alarmeret 1-1-2 og møder ambulancepersonalet ved kontaktpunkt 6 og kontakter den ansvarlige læge på Brandevej eller forvagt.

Efter ankomst af ambulance:

- find journal i Clinical Suite
- kontaktperson med kendskab til patienten bliver på stuen
- sørg for afskærmning
- kontaktpersonen tager sig af de pårørende
- ved mors tager kontaktpersonen sig af det praktiske

## Basal genoplivning

### 1. Er patienten bevidstløs:

- Hvis nej: Bliv hos patienten og afvent assistance.
- Hvis ja: **Trækker den bevidstløse vejret**
  - Hvis ja: læg i sideleje og giv 100 % ilt.
  - Hvis nej: sørg for frie luftveje og **undersøg herefter om der er normal respiration.**
    - Hvis ja: vedligehold frie luftveje
    - Hvis nej:
      - **Voksen:** Påbegynd hjertemassage med 30 kompressioner efterfulgt af 2 effektive indblæsninger (30/2), som fortsættes indtil ambulancen ankommer. (Hastighed: 100-120 kompressioner/minut)
      - **Barn – før pubertæt:** Giv 5 indblæsninger og vurder om patienten fortsat er bevidstløs og uden tegn på cirkulation.
        - Hvis ja: Påbegynd hjertemassage med 15 kompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger (15/2), som fortsættes indtil ambulancen ankommer.
        - Hvis nej: vedligehold frie luftveje og fortsæt ventilation
- Påmonter hjertestarter så hurtigt som muligt
  - Følg anvisningerne fra hjertestarteren

### 2. Ved ankomst af ambulance/lægebil assisteres med hjertemassage efter anvisning.