

TOP-UP EPIDURAL

Akut sectio i opsprøjtet fødeepi

INDHOLD

Indhold i pose:

Lidokain 20mg/ml med adrenalin
5 ampuller af 5 ml

Sufenta 5 mikrogram/ml
2 ampuller af 2 ml

2 stk. 10 ml sprøjter
1 stk. 5 ml sprøjte
3 optrækskanyler

TOP-UP EPIDURAL

Akut section I epidural

OPSKRIFT

Indikationer: Akut sectio grad II og III, hvor velfungerende fødeepidural allerede er anlagt, samt forventede intubationsvanskeligheder, malign hypertermi, porfyri, acetylcholinesterase abnormitet eller præeklamsi.

Blokade:

Dosering efter vurdering af patient højde, vægt, og almentilstand.

Refrakte doser Lidocain 20 mg/ml med adrenalin 5 µg/ml alt 15 – 25 ml. "normaldosis" 20 ml (400mg).

Tilsat refrakte doser Sufentanil 5 µg/ml, i alt 10-20 µg. "Normaldosis" 4 ml (20 µg)

BT-fald forebygges eller behandles med yderligere venstreforskydning af uterus, samt refrakte doser Efedrin® 5-10 mg i.v.

Se PRI : Obstetrisk anæstesi - anæstesi til gravide
ra uge 20 til 24 timer post partum