

# Arbejdsark til DVT patienter

STOR LABEL:

Dato:

## Værdier der måles

SAT:

Puls:

BT:

Temp:

D-dimer:

EKG viser:

Patientens telefonnr.:

Navn på spl.:

Hø. læg i cm:

Hø. ankel i cm:

Ve. læg i cm:

Ve. ankel i cm:

Spørg ind til vejrtrækningsproblemer (LE):

## Wells score

Aktiv malign sygdom med behandling inden for de sidste 6 mdr. (f.eks. cancer)

Point

+1

Sengeliggende > 3 dage eller operation inden for den sidste måned

+1

Lokaliseret ømhed langs dybe vener

+1

Ensidig hævelse af UE

+1

Hævelse på læggen svarende til >3 cm. sammenlignet med asymptomatisk side

+1

Sandsynlighed for DVT

Ensidig pitting ødem

+1

Sum:

Ensidig dilatation af overfladiske vener (ikke varicer)

+1

0 = Lav

Tidligere DVT

+1

1-2 = Intermediær

Diagnoser ligeså sandsynlige som DVT

-2

>3 = Høj

Sum: \_\_\_\_\_

Er benet koldt, blegt og uden puls, skal der straks tages kontakt til **kardiologisk bagvagt på 40832**

Behandlingsplan/yderligere kommentarer fra spl: \_\_\_\_\_

### Blodfortyndende behandling

Inden der kan udleveres blodfortyndende behandling sikres det, at patienten ikke har øget blødningsrisiko.

Der spørges om patienten inden for de sidste 2 uger:

- Har kastet blod op ja/nej
- Har haft blod i urin og afføring ja/nej
- Har haft kraftig næseblod ja/nej
- Er blevet opereret ja/nej

Yderligere skal spl. spørge patienten om:

- Har mange blå mærker ja/nej
- Har dårligt reguleret hypertension ja/nej
- Er gravid ja/nej
- Har aktiv cancer ja/nej

Svarer patienten Ja til én af de ovenstående, skal patienten, konfereres med kardiologisk bagvagt 40832, **INDEN** opstart af blodfortyndende behandling.