

Skulder-/albue-regimer



ASD (=dekompression) - AC-resektion	Klavikelfrakstur, operation
Bicepstenodese	Olecranon fraktur
Bicepstenotomi	Proksimal humerusfraktur, konservativ behandling
Caput radii	Proksimal humerusfraktur, operation
Corpus humeri fraktur	Rotator cuff sutur
Distal bicepssene suturering	Scapulafraktur, konservativ behandling
Distal humerusfraktur	Scapulafraktur, operation
Fjernelse af klavikelskinne	Skulderalloplastik
Frossen skulder med Kinetec	Skulderluksation, konservativ behandling
Frossen skulder uden Kinetec	Skulderluksation, restrikt regime
Klavikelfrakstur, konservativ behandling	Skulderluksation, vanligt regime

[Patientforløbsbeskrivelse for skulder-/albueopererede patienter på Aalborg Universitetshospital, Farsø Sygehus](#)

[Standardordinationsoversigt - smertepakker](#)

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------	---------	-------------	---------	--

Alle operationspatienter skal medbringe: Medicinliste og egen medicin i original emballage. Helst ikke medicin-doseret (kun af nød). Fornuftigt fodtøj/tøj. Ved indlæggelse også toiletartikler.

Operationspatienter skal evt. pausere AK-behandling, insulin og NSAID ifølge anæsthesitilsyn.

Link: [Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder-/albuepatienter til operation i Farsø](#)

Klavikelfrakur, operation	Klavikelfrakur	Type: ja Bac-test: nej Se link	Operation af brækket kraveben Sådan træner du efter operation af brud på kravebenet Brud på kraveben som ikke vil hele	Dagkirurgi De første 6 uger efter operationen må pt. bruge armen frit inden for smertegrænsen. Collar 'n cuff. til aflastning højst 3 uger. Sygemelding: 0-12 uger afhængig af jobfunktion og funktionsniveau.	(dagkir. + morfin pn.) Paracetamol, ibuprofen, morfin, pantoprazol, laksantia	Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage. Amb 6-8 uger med rtg. GOP-behov vurderes ved indlæggelsen eller ved kontrol.	Kan være lettere besværet.
Klavikelfrakur, konservativ behandling	Klavikelfrakur Skadestueinstruks	Patienter, som oftest sendes hjem fra skadestuen.	Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge	Må bruge armen frit indenfor smertegrænsen. Collar 'n cuff 2-3 uger. Sygemelding: 0-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.	Paracetamol, morfin / tradolan, laksantia	Kontrol ved egen læge efter 3 uger, som vurderer genoptræningsbe- hov.	Skadestuen kontakter hjemmeplejen ved behov for hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske
Fjernelse af klavikelskinne	Ingen	Type: nej Bac-test: nej		Dagkirurgi Roligt regime indtil agraf-fjernelse.	(dagkir. +morfin pn.) Paracetamol, ibuprofen, morfin, pantoprazol, laksantia	Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage. Ingen kontrol. Ingen GOP.	Selvhjulpen.
ASD (=dekompression) og/eller AC-resektion	Impingement syndrom	Type: nej Bac-test: nej	Operation for indeklemning i skulder Sådan sætter du en armslynge på Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet	Dagkirurgi Må bruge armen frit indenfor smertegrænsen. Får engangsinstruks på afd. – selvtræner efter udleverede pjecer. Collar 'n cuff <u>kun</u> til aflastning de første dage. Sygemelding: 2-8 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.	(dagkir. +morfin pn.) Paracetamol, ibuprofen, morfin, pantoprazol, laksantia	Suturer fjernes hos egen læge efter 12 dage. GOP-behov vurderes af læge/fysio- terapeut. Kontrol efter selvbooking ved behov.	Ingen restriktioner (smertegrænsen). Kan være lettere besværet.
Bicepstenodese	Ingen	Type: nej Bac-test: nej	Ingen pjecer	Dagkirurgi Collar 'n cuff til aflastning.	(dagkir. + morfin pn.) Paracetamol, ibuprofen, morfin,	Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage.	Vurdér om pt. har brug for hjælp ✚ pers. hygiejne morgen og aften ✚ anretning af mad til måltider

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.
(Bicepssenen løsnes fra cavitas og fikseres med anker i sulcus).			Sådan sætter du en armslynge på	Aktiv ubelastede aktiviteter/øvelser i 6 uger.	pantoprazol, laksantia	Kontrol 6 uger.	<ul style="list-style-type: none"> + evt. medicin-dosering/udtrapning) + Skift af plaster ved behov. Må max. sidde 7 døgn + evt. agraf-fjernelse + evt. toiletbesøg. + indkøb + evt. mad udefra + rengøring og tøjvask Ved behov for hjemmehjælp varsles kommunen dag 0 inden kl. 12
Bicepstenotomi			Ingen	Frit regime			selvhjulpen
Scapulafraktur, konservativ behandling (90%)	Scapulafraktur	Patienter, som oftest sendes hjem fra skadestuen.	Ingen pjece Sådan sætter du en armslynge på	Ved kontrol stillingtagen til opstart af ubelastede bevægeøvelser. Collar´n´cuff efter behov.	Paracetamol, morfin / tradolan, laksantia	Røntgenkontrol 7-10 dage Almen GOP	Skadestuen kontakter hjemmeplejen ved behov for hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske
Scapulafraktur, Operation (10%)	Scapulafraktur	Type: ja Bac-test: nej Se link	Ingen pjece Sådan sætter du en armslynge på	Aflastning efter behov i Collar´n´cuff og bevægeøvelser til smertegrænsen.	Vurderes af kirurgen	Kontrol vurderes af kirurgen Specialiseret GOP	Vurdér om pt. har brug for hjælp <ul style="list-style-type: none"> + pers. hygiejne morgen og aften + anretning af mad til måltider + evt. medicin-dosering/udtrapning) + Skift af plaster ved behov. Må max. sidde 7 døgn + evt. agraf-fjernelse + evt. toiletbesøg. + indkøb + evt. mad udefra + rengøring og tøjvask Ved behov for hjemmehjælp varsles kommunen dag 0 inden kl. 12
Rotator cuff sutur	Rotator-cuff ruptur	Type: nej Bac-test: nej	Operation ved ødelagte sener Sådan sætter du en armslynge på Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Sådan træner du armen efter syning	Dagkirurgi Collar´n´cuff 6 uger eller abduktionsbandage 6 uger. Instruks fys + ergo. 0-6 uger venepumpeøvelser og passive øvelser. Max. 30 grader udad-rotation og 90 grader elevation(særligt regime ved subscapularis). >6 uger aktive øvelser, med langsomt stigende belastning. >12 uger ingen restriktioner.	(dagkir. + depot morfin) Paracetamol, ibuprofen, morfin, pantoprazol, laksantia Langt scalenerblok	Følges hos fys. i specialiseret GOP Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage. Lægekontrol efter 3 mdr.	Pt. har brug for hjælp efter udskrivelse <ul style="list-style-type: none"> + pers. hygiejne morgen og aften + anretning af mad til måltider + evt. medicin-dosering/udtapning + skift af plaster ved behov. Må max. sidde 7 døgn. + evt. agraf-fjernelse + evt. toiletbesøg + indkøb + evt. mad udefra + rengøring og tøjvask

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.
			af supraspinatus – med abduktionsbandage Sådan klarer du bad og påklædning med abduktionsbandage	Sygemelding: 2-3 måneder, mere ved skulderbelastende arbejde.			Hvis der ikke er pårørende i hjemmet har patienten brug for hjælp efter udskrivelse. Ved behov for hjemmehjælp varsles kommunen dag 0 inden kl. 12.
Skulderluksation Bankart operation eller Bristow-Lartarjet Restriktivt regime	Instabilitet, klassifikation og udredning Akut traumatisk anterior skulderluksation	Type: ja Bac-test: nej Se link	Sådan træner du armen efter stabiliserende operation af skulderen Sådan sætter du en armslynge på Stabilisering af skulderleddet	Dagkirurgi 0-3 uger med venepumpeøvelser og passive øvelser max 0 grader. udadrotation og 90 graders elevation. Bandage dag og nat. 3-6 ugers aktive ubelastede øvelser med max. 0 graders udadrotation og 90 graders elevation. Bandage om natten. > 6 uger ingen restriktioner. Styrke/stabilitetstræning vejledt af fys. Ingen kontaktsport før 6 mdr. Sygemelding: 6-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.	(dagkir. + morfin pn.) Paracetamol, ibuprofen, morfin, pantoprazol, laksantia Langt scalenerblok	6 uger + rtg. Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage. Specialiseret GOP	Pt. har brug for hjælp efter udskrivelse <ul style="list-style-type: none"> ✚ pers. hygiejne morgen og aften ✚ anretning af mad til måltider ✚ evt. medicin-dosering/udtrapning) ✚ skift af plaster ved behov. Må max. sidde 7 døgn ✚ evt. agraf-fjernelse ✚ evt. toiletbesøg ✚ indkøb + evt. mad udefra ✚ rengøring og tøjvask Hvis der ikke er pårørende i hjemmet har patienten brug for hjælp efter udskrivelse. Ved behov for hjemmehjælp varsles kommunen dag 0 inden kl. 12.
Skulderluksation Bankart operation eller Bristow-Lartarjet Vanligt regime	Instabilitet, klassifikation og udredning Akut traumatisk anterior skulderluksation	Type: ja Bac-test: nej Se link	Sådan træner du skulderen efter stabiliserende operation af skulderen - vanligt regime Sådan sætter du en armslynge på	Dagkirurgi 0-2 uge Collar´n´cuff dag og nat, må lave passive øvelser dog max 120° fleksion og 50% udadrotation sammenlignet med rask side. 2-4 uge Collar´n´cuff kun om natten. Der påbegyndes ledet aktive øvelser gående mod aktive indenfor ovenstående bevægerestriktioner. Efter 4 uger må patienten bevæge frit, men ikke lave overpres i abduktion og udadrotions-bevægelser. Patienten må instrueres i stabiliserende øvelser for rotatorcuffen. Collar´n´cuff om natten indtil 6 uger.	(dagkir. + morfin pn.) Paracetamol, ibuprofen, morfin, pantoprazol, laksantia Langt scalenerblok	6 uger + rtg. Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage. Specialiseret GOP	Pt. har brug for hjælp efter udskrivelse <ul style="list-style-type: none"> ✚ pers. hygiejne morgen og aften ✚ anretning af mad til måltider ✚ evt. medicin-dosering/udtrapning) ✚ skift af plaster ved behov. Må max. sidde 7 døgn ✚ evt. agraf-fjernelse ✚ evt. toiletbesøg ✚ indkøb + evt. mad udefra ✚ rengøring og tøjvask Hvis der ikke er pårørende i hjemmet har patienten brug for hjælp efter udskrivelse. Ved behov for hjemmehjælp varsles kommunen dag 0 inden kl. 12.

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.						
				Sygemelding: 6-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.									
Skulderlaksation konservativ behandling	Akut traumatisk anterior skulderlaksation Skadestueinstruks	Patienter, som oftest sendes hjem fra skadestuen.	Sådan sætter du en armslynge på	Collar´n´cuff max 3 uger. 0-3 uger aktivitet indenfor smertegrænsen. Undgå tunge træk, skub og løft i 6 uger. Sygemelding: 0-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.	Paracetamol, morfin / tradolan, laksantia	Kontrol 3-4 uger efter skaden evt. ved fys. GOP vurderes af læge eller fysioterapeut til kontrol.	Skadestuen kontakter hjemmeplejen ved behov for hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske.						
Frossen skulder Skulder release operation – med kinetec	Ingen	Type: nej Bac-test: nej Se link	Sådan træner du efter skulder-release operation	Indlæggelsestid 1-4 dage. Ingen restriktioner. Fri bevægelighed – pt. skal forvente nogen smerte under og efter træning – obs. sm. stillende inden træning. Træner i CPM (Kinetec) 2-3 dage – ½ time hver anden time. Sygemelding: 2-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion når bevægeligheden er acceptabel.	Vurderes af kirurgen Under indlæggelsen Smertepumpe m. naropin.	Kontrol 3 mdr. Specialiseret GOP til opstart senest 1 uge postoperativt	Oftest yngre mennesker, som har et netværk Ingen restriktioner, men kan være lettere besværet.						
Frossen skulder Skulder release operation – uden kinetec	Ingen	Type: nej Bac-test: nej	Sådan træner du efter skulder-release operation	Dagkirurgi Intensiv selvtræning indtil GOP starter. Sygemelding: 2-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion, når bevægeligheden er acceptabel.	Vurderes af kirurgen	Specialiseret GOP til opstart senest 1 uge postoperativt							
Skulderalloplastik Hemialloplastik TSA - total skulderalloplastik Reverse totalprotese	Skulderleds- alloplastik	Type: ja Bac-test: ja Se link Hgb+væsketal+EKG Dag 1. Postoperativ rtg.	Sådan sætter du en armslynge på Indsættelse af skulderprotese ved ledsygdom Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese	Indlæggelsestid: 1-3 dage Collar´n´cuff skal bæres i 6 uger. 0-6 uger venepumpeøvelser og passive øvelser. max. 0 grader udadrotation og 90 elevation. > 6 uger ubelastede aktive øvelser med stigende belastning. >12 uger ingen restriktioner	philos-hemiallo Antibiotika Antibiotikaprofylakse ved skulder- og albuekirurgi i Ortopædkirurgien Langt scalenerblok	Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage. Almen GOP Uden RSA: kontrol efter 6 uger og 3 mdr. Ved RSA <table border="1"> <tr> <td>6 uger+rtg</td> <td>Læge</td> </tr> <tr> <td>3 mdr+rtg</td> <td>Læge</td> </tr> <tr> <td>6 mdr</td> <td>Kun rtg</td> </tr> </table>	6 uger+rtg	Læge	3 mdr+rtg	Læge	6 mdr	Kun rtg	Pt. har brug for hjælp efter udskrivelse ✚ pers. hygiejne morgen og aften ✚ anretning af mad til måltider ✚ evt. medicin-dosering/udtapning) ✚ skift af plaster ved behov. Må max. sidde 7 døgn. ✚ evt. agraf-fjernelse ✚ evt. toiletbesøg ✚ indkøb + evt. mad udefra
6 uger+rtg	Læge												
3 mdr+rtg	Læge												
6 mdr	Kun rtg												

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.				
				Sygemelding: 6-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.		<table border="1"> <tr> <td>1 år</td> <td>Fys</td> </tr> <tr> <td>2 år</td> <td>Kun rtg</td> </tr> </table>	1 år	Fys	2 år	Kun rtg	<ul style="list-style-type: none"> ✚ rengøring og tøjvask <p>Hvis der ikke er pårørende i hjemmet har patienten brug for hjælp efter udskrivelse.</p> <p>Ved behov for hjemmehjælp varsles kommunen dag 0 inden kl. 12.</p>
1 år	Fys										
2 år	Kun rtg										
Proksimal humerus-fraktur Operation	Proksimal humerus-fraktur	<p>Type: ja Bac-test: ja Se link Hgb+væsketal+EKG</p> <p>Medicinpause: -AK-behandling: (udfyld skema) -Insulin, NSAID</p> <p>Dag 1. Postoperativ rtg.</p>	<p>Indsættelse af skulderprotese efter brud på skulder eller Indsættelse af skinne ved brud på skulderen</p> <p>Sådan sætter du en armslynge på</p> <p>Sådan træner du efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne (tilrettes ved liberalt regime)</p> <p>Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese</p>	<p>Indlæggelsestid: 1-2 dage Liberalt regime: Indlæggelsestid 1-2 dage. Collar´n´cuff efter behov, max 6 uger. Instruks fys. + ergo.</p> <p>0-6 uger venepumpeøvelser, ubelastede aktive øvelser.</p> <p>>6 uger ingen restriktioner</p> <p>Sygemelding: 2-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.</p> <p>Restriktivt regime: Collar´n´cuff skal bæres i 6 uger. Sådan sætter du armslynge på</p> <p>Instruks fys. + ergo.</p> <p>0-6 uger venepumpeøvelser og passive øvelser, max. 0 udadrotation og 90 elevation.</p> <p>>6 uger ubelastede aktive øvelser med stigende belastning. >12 uger ingen restriktioner.</p> <p>Sygemelding: 6-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.</p>	<p>philos-hemiallo</p> <p>Antibiotika Antibiotikaprofylakse ved skulder- og albuekirurgi i Ortopædkirurgien</p> <p>Langt scalenerblok</p>	<p>6 uger + rtg. Agraffer fjernes hos egen læge efter 12 dage.</p> <p>Almen GOP</p>	<p>Pt. har brug for hjælp efter udskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ pers. hygiejne morgen og aften ✚ anretning af mad til måltider ✚ evt. medicin-dosering/udtapning) ✚ skift af plaster ved behov. Må max. sidde 7 døgn ✚ evt. agraf-fjernelse ✚ evt. toiletbesøg ✚ indkøb + evt. mad udefra ✚ rengøring og tøjvask <p>Hvis der ikke er pårørende i hjemmet har patienten brug for hjælp efter udskrivelse.</p> <p>Ved behov for hjemmehjælp varsles kommunen dag 0 inden kl. 12.</p>				
Proksimal humerus-fraktur, konservativ behandling	Proksimal humerus-fraktur	Patienter, som oftest sendes hjem fra skadestuen.	<p>Sådan sætter du en armslynge på</p> <p>Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen</p>	<p>Collar´n´cuff 3 uger. 0-3 uger venepumpeøvelser og passive øvelser. max. 0 grader udadrotation og elevation 90 grader.</p>	<p>Paracetamol, morfin/tradolan, laksantia</p>	<p>7-10 dage + rtg. ved fys Almen GOP</p>	<p>Skadestuen kontakter hjemmeplejen ved behov for hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske</p> <p>Vurdér om pt. har brug for hjælp</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ pers. hygiejne morgen og aften ✚ anretning af mad til måltider 				

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.
				<p>3-6 uger ubelastede aktive øvelser.</p> <p>>6 uger: ingen restriktioner, men med stigende belastning.</p> <p>Sygemelding: 4-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion.</p>			<ul style="list-style-type: none"> + evt. medicin-dosering/udtrapning) + evt. toiletbesøg + indkøb + evt. mad udefra + rengøring og tøjvask <p>Hvis der ikke er pårørende i hjemmet har patienten brug for hjælp efter udskrivelse.</p>
Corpus humeri fraktur, konservativ behandling	Ingen	<p>Type: nej</p> <p>Bac-test: nej</p>	<p>Sarmiento-bandage</p>	<p>Sjældent indlagt.</p> <p>Sarmiento-bandage.</p> <p>Instrueres i vene/pumpe øvelser (plejepersonale).</p> <p>Sygemelding ca. 8-12 uger indtil tilstrækkelig heling ift. jobfunktion.</p>	<p>Paracetamol, morfin / tradolan, laksantia</p>	<p>Indenfor 1 uge + til samiento-bandagering i amb. med efterfølgende rtg. kontrol.</p> <p>2. uge i sygeplejerske-amb. til stramning</p> <p>6. uge med rtg. 8-12. uge + rtg.</p> <p>GOP vurderes af læge el. fysioterapeut til kontrol.</p>	<p>Skadestuen kontakter hjemmeplejen ved behov for hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske.</p> <p>Pt. kan have brug for hjælp til:</p> <ul style="list-style-type: none"> + pers. hygiejne morgen og aften + anretning af mad til måltider + evt. medicin-dosering/udtrapning) + evt. toiletbesøg + indkøb + evt. mad udefra + rengøring og tøjvask
Distal humerus-fraktur (Olécranon-fraktur)	<p>Distal humerus-fraktur (voksne)</p>	<p>Type: ja</p> <p>Bac-test: Nej</p> <p>Se link</p>	Ingen	<p>Indlæggelsestid:</p> <p>0-1 dag.</p> <p>Vinkelgips eller cubitofix 1-2 uger. Ubelastede bevægeøvelser fra 2.-6. uge. Stigende belastning fra 6. uge.</p> <p>Sygemelding: 2-12 uger afhængig af funktionsniveau og jobfunktion, når bevægeligheden er acceptabel.</p> <p>Plejepersonalet instruerer i venepumpe-øvelser.</p>	Stor smertepakke	<p>Kontrol 2 uger til agraf fjernelse og evt. bandageskift til hængsel-bandage</p> <p>ELLER</p> <p>Agraffer og bandage fjernes hos egen læge efter 2 uger.</p> <p>Kontrol 6 uger + rtg.</p> <p>Almen GOP udarbejdes ved indlæggelsen</p>	<p>Pt. kan have brug for hjælp til:</p> <ul style="list-style-type: none"> + pers. hygiejne morgen og aften + anretning af mad til måltider + evt. medicin-dosering/udtrapning) + evt. toiletbesøg + indkøb + evt. mad udefra + rengøring og tøjvask

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.
Distal bicepssene suturering	Distal bicepsseneruptur	Type: nej Bac-test: nej		Dagkirurgi Vinkelgips eller cubitofix i 2 uger Sygemelding: 3 mdr. afhængig af jobfunktion. (Fuld belastning tillades først efter 3 mdr.)		Egen læge 2 uger Amb. 6 uger Evt. GOP	Pt. kan have brug for hjælp til: <ul style="list-style-type: none"> + pers. hygiejne morgen og aften + anretning af mad til måltider + evt. medicin- dosering/udtrapning) + evt. toiletbesøg + indkøb + evt. mad udefra + rengøring og tøjvask
Caput radii	Caput radii fraktur						

Skulder/albue Diagnose	Lægefaglige PRI-instrukser	Forundersøgelse Blodprøver	Pjecer	Regimer	Smertepakke	Kontrol	Hvornår kontaktes hjemmeplejen/visitator.
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------	---------	-------------	---------	--

Gå til ordinationsoversigt (ordinationeret – kun læger)

Højreklik et tilfældigt sted i ordinationsoversigten

Vælg "Opret ordination"

Vælg fanen "Standardordinationspakker"

Søg: Skulderoperation

Vælg fx smertepakke for dagkir.:

f Vælg præparat ×

Apotekpræparat
Lægemiddelblandinger
Standardordinationer
Standardordinationspakker

Søg: Antal pakker: 11

Standardordinationspakke ▲	Vejledning
Skulderoperation (dagkir. + morfin pn)	

Vælg fx smertepakke for rotator cuff:

f Vælg præparat ×

Apotekpræparat
Lægemiddelblandinger
Standardordinationer
Standardordinationspakker

Søg: Antal pakker: 11

Standardordinationspakke ▲	Vejledning
Skulderoperation (Rotator cuff. ruptur) Morfin LILLE	
Skulderoperation (Rotator cuff. ruptur) Morfin STOR	
Skulderoperation (Rotator cuff. ruptur) Oxycodon LILLE	
Skulderoperation (Rotator cuff. ruptur) Oxycodon STOR	
Skulderoperation (Rotator cuff. ruptur) Tapentadol LILLE	
Skulderoperation (Rotator cuff. ruptur) Tapentadol STOR	

Eller vælg fx smertepakke for philos-hemiallo:

f Vælg præparat ×

Apotekpræparat
Lægemiddelblandinger
Standardordinationer
Standardordinationspakker

Søg: Antal pakker: 11

Standardordinationspakke ▲	Vejledning
Skulderoperation (philos-hemiallo) Morphin 10 mg x 2	
Skulderoperation (philos-hemiallo) Morphin 20 mg x 2	
Skulderoperation (philos-hemiallo) Oxycodon	
Skulderoperation (philos-hemiallo) Tapentadol	