

Clostridium Difficile **Isolation**

4.2.6

PERSONALE



VED KONTAKT MED
PATIENTNÆRETING
ANVENDES

HANDSKER



DER SKAL FORETAGES
HÅNDVASK OG
HÅNDDESINFEKTION
FØR STUEN FORLADES

HÅNDVASK



OG

LANGÆRMET
ARBEJSDRAGT-
BESKYTTELSE



HÅNDDESINFEKTION

Ved risiko for hoste, stænk og sprøjt anvendes desuden



KIRURGISK MASKE

OG



BESKYTTELSES BRILLER

BESØGENDE: Før stuen forlades udføres



HÅNDVASK

Klargøring til modtagelse af C.diff. patient

- Smittemåden er fækal-oral, samt direkte og indirekte kontakt
 - dog skal man være opmærksomme på, at C. diff. danner sporer, som betragtes som støvbårne
- Ved risiko for kontaminering af udstyr eller inventar på undersøgelses- eller behandlingsstuen, i praksis indenfor 1 meters afstand fra patienten, skal udstyret fjernes eller tildækkes eller rengøres og desinficeres efter endt behandling

Rengøring efter C. diff. patient

- De steder, hvor patienten har haft kontakt, samt der hvor personalet efter patientkontakt har haft sine hænder, skal efter endt undersøgelse rengøres og desinficeres med et klorholdigt produkt
 - Der skal anvendes værnemidler ved rengøring/desinfektion
- Gulve, der er synligt rene, rengøres og desinficeres med klorholdigt produkt
- Apparaturl og medicinske flergangsartikler, der har været anvendt i forbindelse med undersøgelse og behandling, rengøres og desinficeres med et klorholdigt produkt