

PERSONALE



VED DIREKTE PATIENTKONTAKT OG KONTAKT MED PATIENTNÆRE TING ANVENDES:

HANDSKER



OG

LANGÆRMET ARBEJDSDRAGT-BESKYTTELSE



DER SKAL FORETAGES HÅNDEINFEKTION FØR STUEN FORLADES

HÅNDEINFEKTION

Ved risiko for stænk og sprøjt anvendes desuden:



BESKYTTELSERBRILLER OG KIRURGISK MASKE

BESØGENDE:

skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

Klargøring til modtagelse af Influenza A patient

- Smittemåden er dråbesmitte samt direkte og indirekte kontakt
- Ved risiko for kontaminering af udstyr eller inventar på undersøgelses- eller behandlingsstuen, i praksis indenfor 1 meters afstand fra patienten, skal udstyret fjernes eller tildækkes eller rengøres og desinficeres efter endt behandling

Rengøring efter Influenza A patient

- De steder, hvor patienten har haft kontakt, samt der hvor personalet efter patientkontakt har haft sine hænder, skal efter endt undersøgelse rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. Hospitalssprit)
 - Der skal anvendes værnemidler ved rengøring/desinfektion
- Apparaturl og medicinske flergangsartikler, der har været anvendt i forbindelse med undersøgelse og behandling, rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. Hospitalssprit)