

Vejledning til brug af automatiseret dataoverførsel til Depressionsdatabasen, Ambulante

Følgende vejledning omhandler:

1. Vigtige FAQ til sikring af automatisk overførsel
2. Fremsøgning og brug af RKKP satellitten
3. Fremsøgning af skabeloner
4. Hvilken dokumentation der overføres automatisk, når kravene til struktureret dokumentation i Clinical suite (CCS) er opfyldt

Vigtige FAQ til sikring af automatisk overførsel

For at alle relevante data tilknyttet de enkelte indikatorer i databasen overføres automatisk fra CSC til RKKP, er det vigtigt, at følgende sikres:

- a. Der skal dokumenteres det rette sted i rette skabeloner i CSC (se vejledning i næste afsnit).
- b. Der skal dokumenteres inden for patientens kontakt (dokumentation der sker efter patienten er udskrevet eller afsluttet kommer ikke med, medmindre tidspunktet ændres så det ligger inden for kontakten).
- c. Undersøgelser og vurderinger mv. skal foregå og dokumenteres indenfor det tidsrum som indikatoren foreskriver (ex. Indikatorområde 1: Udredning – Indberettes kun for incidente patienter *inden for 12 måneder fra diagnosedatoen*).
- d. Brug RKKP satellitten i CSC som tjekliste, så det sikres, at alle indikatorer er opfyldt inden for rette tid jf. databasens indikator.

RKKP it lister: Flere steder modtager lister x 1 mdr. over de patienter som indgår i databasen. Disse lister viser et overblik over, hvilke indikatorer der er opfyldte for de enkelte patienter, og hvilke der ikke er. Det er vigtigt at vide, at der er et slip mellem de sidste overførte data til RKKP og det udtræk der fremgår af de lister man modtager ude i enhederne – derfor vil man af og til opleve at nogle data mangler.

Disse lister bør bruges vejledende og man bør først og fremmest orientere sig i RKKP satellitten samt følge FAQ a – d, for at sikre sig, at alle data er korrekt registreret og dermed overføres til RKKP.

Vejledning til brug af RKKP satellitten, brugen af de rette skabeloner til dokumentation mv.

I de følgende er det beskrevet og illustreret, hvordan RKKP satellitten fremsøges og bruges, samt hvordan der korrekt dokumenteres i forhold til de enkelte indikatorer i databasen.

Det er helt nødvendigt, at få afklaret, hvilke faggrupper der dikterer, og hvilke der skriver i CCS. Dem der dikterer, **skal** diktere ud fra de relevante skabeloner, så den sekretær der skal skrive i CCS ikke kan komme i tvivl om hvor dokumentationen skal skrives, så automatisk overførsel kan ske.

Vejledningen gennemgår systematisk de 8 indikatorer som er relevante for det ambulante område.

Vejledning til fremsøgning og brug af RKKP satellitten

Fremsøgning af RKKP satellitten

1. Vælg faneoverblik
2. Vælg enten Behandling eller Pleje
3. Klik på RKKP fanen

The screenshot shows the RKKP satellite interface. On the left, a menu titled 'Faneoverblik' is open, listing various medical areas with keyboard shortcuts. The 'Psykiatrisk område' is highlighted. A red arrow points to the 'Behandling' option in the sub-menu. On the right, the main interface shows a tabbed view with 'RKKP' selected. A red arrow points to the 'RKKP' tab. Another red arrow points to the 'Behandling' option in the sub-menu.

Brugen af RKKP satellitten

1. Klik på RKKP indikatorer for depression
2. Klik på "tandbørsten"

I satellitten kan man få overblik over hvorvidt indikatorerne er dokumenteret.

The screenshot shows the RKKP satellite interface. The main window displays a list of indicators for depression and schizophrenia. A red arrow points to the 'RKKP-indikatorer for depression (1)' section. Another red arrow points to the 'tandbørsten' icon in the top right corner. The interface includes a menu bar with options like 'Diagnoser', 'Notater', 'Notater og resultater', 'Status', 'Tvang', 'Provesvar', 'Kumuleret svar', 'Værdier', 'Medicin', 'Pt.opl./sociale forhold', 'Pleje', 'Opøvelsten', and 'RKKP'. The main content area shows a table of indicators with columns for 'Indikator', 'Seneste registrering', and 'Seneste resultat'. A context menu is open over the 'RKKP-indikatorer for depression (1)' section, showing options like 'Vurdering vedrørende sociale støttebehov/social udredning', 'Ingen indikation for vurdering af depressionsværhedsgrad', 'Ingen indikation for pårørendekontakt', 'Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri', 'Somatisk udredning/undersøgelse foretaget i andet regi', and 'Tilbud om psykoterapi'. The bottom of the menu shows 'Maksimer i nyt vindue' (Ctrl+X) and 'Angiv ny søgeperiode'.

Frem søgning af skabeloner

1. Klik på "Skabeloner" i funktionsmenuen.
2. Her fremkommer en træstruktur med alle tilgængelige skabeloner

Under Psykiatri (Blå pil) findes udover en række psykiatrispecifikke skabeloner også adgang til at registrere de indikatorer der skal registreres via satellitten.

The screenshot shows the RKKP satellite interface with the 'Skabeloner' (Templates) menu open. A red arrow points to the 'Skabeloner' button in the top left corner. A blue arrow points to the 'Psykiatri' folder in the tree structure. The interface includes a menu bar with options like 'Diagnoser', 'Notater', 'Notater og resultater', 'Status', 'Tvang', 'Provesvar', 'Kumuleret svar', 'Værdier', 'Medicin', 'Pt.opl./sociale forhold', 'Pleje', 'Opøvelsten', and 'RKKP'. The main content area shows a list of indicators for depression and schizophrenia. The 'Skabeloner' menu is open, showing a tree structure of templates. The 'Psykiatri' folder is highlighted with a blue arrow. The tree structure includes folders like 'Behandling', 'Kontinuationer', 'Behandlingsniveau', 'Farmskema', 'Gennemgang - psykiatri', 'Journalnotat - psykiatri', 'Journaloptagelse - psykiatri', 'Konferencenotat - psykiatri', 'Opøvelsenotat', 'Procedurenotat - psykiatri', 'psykiatrisk behandlingsplan', 'psykiolognotat - psykiatri', 'Smertebehandling', 'Smertebehandling', 'Tilførselsnotat - psykiatri', 'Tvangsrelateret notat', 'Udskriftsbehandling - psykiatri', 'Epilekse', 'Psykiatri', 'Vurderinger - lægeundersøgelse', 'Dialog', 'Observationer', 'Patientoplysninger', 'Pleje', 'Rådgivning', 'Screeninger', 'Skabeloner', 'Terapi', 'Vurderinger', and 'Andre registreringer'.

Vejledning til korrekt dokumentation i CSC (indikatoropdelt)

Indikator 1b: Vurdering ved speciallæge i psykiatri
(Senest 30 dage efter 1. ambulante besøg)

Med vurdering forstås at speciallægen har set og vurderet patienten – enten ved direkte patientkontakt eller via et direkte teletransmitteret interview – og at der er taget stilling til aktuel og fremtidig behandling

Koden ZP0010C (voksen)/ZP0010D (børn) overføres automatisk når speciallægens 4 cifers brugerkode fremgår af journalnotatet.

Ingen indikation for speciallægevurdering: Dokumenteres via satellitten, og herefter overføres koden ZZ005B1 automatisk

1. klik her

2. dokumentation fremgår her

Indikator 2b: Somatisk udredning
(Senest 30 dage efter 1. ambulante besøg)

Koden ZZ0149AX (somatisk udredning) overføres automatisk når dokumentationen i CCS er foretaget struktureret (ved brug af skabeloner).

KRAV til automatisk overførsel af ZZ0149AX:


1. Objektiv undersøgelse dokumenteret via skabelon enten ifm "Journaloptagelse- Psykiatri", "Gennemgang-psykiatri" eller "Journalnotat- psykiatri".

The screenshot shows a software interface with a left-hand menu and a main content area. In the menu, under 'Element', there is a list of templates including 'Journalnotat - psykiatri'. A red arrow points to the 'Skabeloner' tab in the menu. In the main content area, there is a patient record for '25.04.2019 11:09'. Under the 'Journalnotat' section, there is a list of checkboxes for different template sections, with 'OBJEKTIV UNDERSØGELSE' checked. A red arrow points to this checked item.

2. Højde og vægt fremgår i skabelonen "Mål og vægt"

The screenshot shows a list of templates in a software interface. A red arrow points to the 'Mål og vægt - tabel (0) [-4 uger]' template. Below the list, there is a table with columns for 'Højde', 'Vægt', 'BMI', 'ABW', 'Legemsoverflade', 'Tøjemål', 'Abdominalomfang', and 'Hovedomfang'. A red arrow points to the 'Højde' and 'Vægt' columns in the table.


3. BT fremgår i skabelonen "ABCDE værdier"

	 <p>4. EKG og blodprøver fremgår af "kumuleret svar"</p> <p>Koden ZZ0149A (somatisk undersøgelse) overføres automatisk når dokumentationen i CCS er foretaget struktureret (ved brug af skabeloner).</p> <p>KRAV til automatisk overførsel af ZZ0149A: Ovenstående punkter 1-3 er alle dokumenteret struktureret ved brug af skabeloner.</p> <p>Somatisk udredning /Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi: Klikkes af via Satellitten og "tandbørsten". Herefter overføres koden: AWX17 + ZZ0149/ZZ0149AX automatisk.</p>
<p>Indikator 3b: Vurdering af sociale støttebehov (Senest ved afslutningen)</p>	<p>Koden ZZV005C overføres automatisk når det i satellitten fremgår, at der er foretaget en vurdering af behovet.</p> <p>Gå ind i satellitten via RKKP fanebladet og klik på tandbørsten. Klik på "Vurdering vedr. sociale støttebehov/social udredning" Klik af om der er behov eller ej. Derefter vil det som nedenfor fremgå at der er foretaget en vurdering.</p>

Indikator	Seneste registrering	Seneste resultat
Vurdering ved speciallæge	25.04.2019 10:54	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
Vurdering vedr. sociale støttebehov	25.04.2019 11:42	Ingen behov for sociale støttebehov
Depressionssværhedsgrad		
Selvmodersrisikovurdering ved indlæggelse		
Selvmodersrisikovurdering ved udskrivelse		
Pårørendekontakt	14.06.2018 15:18	Pårørende, informeret om indlæggelse: Ja
Tilbud om psykoterapi (kun ambulante)		

Indikator 4b: Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-17 ved opstart af forløb (Senest 30 dage efter 1. ambulante besøg)

Koden ZZV02K1 + værdikode (VPH000-VPH0052) overføres automatisk når vurdering samt score er dokumenteret struktureret i skabelonen



Ingen indikation for vurdering af sværhedsgraden (ZZV005B2) overføres når dette er dokumenteret via satellitten:

Indikatorer (0)

Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad

Ved indlæggelse

Ved udskrivelse

Ved indlæggelse og udskrivelse

Her klikkes i "ved indlæggelse"

Indikator 5b: Vurdering af depressionens sværhedsgrad med HAM-17 ved afslutning af forløbet (maksimalt 30 døgn før afslutning)

Koden ZZV02K2 + værdikode (VPH000-VPH0052) overføres automatisk når vurdering samt score er dokumenteret struktureret i skabelonen

Hamiltons Depressionsskala

Indikatorer (0)

Hamiltons Depressionsskala
hypokondermanreaktion, og skal vurderes i item 15.

13. Generelle somatiske symptomer
Dette item omhandler følelsen af træthed, udmattelse, nedsat energiløshed, men også diffuse muskelsmerter, f.eks. i nakke eller skulder, ryg, eller lemmer.

14. Seksuelle forstyrrelser
Dette item omfatter nedsat seksual lyst eller interesser. Det er ofte vanskeligt at nære sig, specielt hos ældre patienter.

15. Hypokondri (somatisering)
Omfatter noget optagethed af legemstilstanden.

16. Sygdomsindsigt
Dette item er kun meningsfuldt at vurdere hvis intervieweren selv mener at patienten har en depressiv tilstand.

17. Vægttab
Her bør der så vidt muligt opnås information om legemsvægten målt i kg.

Resultat

Svær depression

Moderat depression

Let depression

Ingen depression

Andet resultat

Score

Ingen indikation for vurdering af sværhedsgraden (ZZV005B2) overføres når dette er dokumenteret via satellitten:

<p>Indikator 6b: Selvmondsrisikovurdering ved 1. ambulante besøg (Senest 1 døgn efter 1. ambulante besøg)</p>	<p>Koden ZZ9970FA1 overføres automatisk, når selvmordsrisikovurderingen er dokumenteret struktureret ved hjælp af skabelonen (skabelonen findes ifm journaloptagelsen, gennemgang og journalnotater):</p> <p>Selvmondsrisikoniveau</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ingen øget selvmordsrisiko <input type="radio"/> Øget selvmordsrisiko <input type="radio"/> Akut øget selvmordsrisiko
<p>Indikator 8: Tilbud om psykoterapi (Senest 90 døgn efter 1. ambulante besøg)</p>	<p>Koden ZZ5731 overføres automatisk hvis det er dokumenteret i satellitten at der er givet tilbud Koden ZZV005B3 overføres automatisk hvis det er dokumenteret i satellitten, at der ikke er indikation for psykoterapi.</p>

Indikator	Seneste registrering	Seneste resultat
Vurdering ved speciallæge	25.04.2019 10:54	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
Vurdering vedr. sociale støttebehov	25.04.2019 11:42	Ingen behov for sociale støttebehov
Depressionsværdigrad		
Selvmodsniskovurdering ved indlæggelse		
Selvmodsniskovurdering ved udskrivelse		
Pårørendekontakt	14.06.2018 15:18	Pårørende, informeret om indlæggelse: Ja
Tilbud om psykoterapi (kun ambulante)	25.04.2019 13:02	Psykoterapi tilbudt

Indikator 9b. Tilbud om pårørendekontakt

Koden BVAA5 overføres automatisk når pårørendekontakt er dokumenteret struktureret via skabelonen: "Samtale med pårørende – Psykiatri".

Er det ikke muligt at få kontakt til pårørende, enten fordi der ikke er pårørende eller fordi patienten/pårørende ikke ønsker kontakt, overføres koden AWZ13B automatisk hvis der er klikket i en af de to muligheder markeret med blå pile. Alternativt kan koden ZZV005B5 overføres, hvis det i satellitten er dokumenteret:

Indikator	Seneste registrering	Seneste resultat
Vurdering ved speciallæge	25.04.2019 10:54	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
Vurdering vedr. sociale støttebehov	25.04.2019 11:42	Ingen behov for sociale støttebehov
Depressionsværdigrad		
Selvmodsniskovurdering ved indlæggelse		
Selvmodsniskovurdering ved udskrivelse		
Pårørendekontakt	25.04.2019 13:39	Ingen indikation for pårørendekontakt
Tilbud om psykoterapi (kun ambulante)	25.04.2019 13:02	Psykoterapi tilbudt

--	--

Reference: [Dansk Depressionsdatabase](#) (datadefinitioner, februar 2019) og (Beregningsregler, juni 2021)