

Vejledning til brug af automatiseret dataoverførsel til Skizofrenidatabasen, Indlagte

Følgende vejledning omhandler:

1. Vigtige FAQ til sikring af automatisk overførsel
2. Fremsøgning og brug af RKKP satellitten
3. Fremsøgning af skabeloner
4. Hvilken dokumentation der overføres automatisk, når kravene til struktureret dokumentation i Clinical suite (CCS) er opfyldt

Vigtige FAQ til sikring af automatisk overførsel

For at alle relevante data tilknyttet de enkelte indikatorer i databasen overføres automatisk fra CSC til RKKP, er det vigtigt, at følgende sikres:

- a. Der skal dokumenteres det rette sted i rette skabeloner i CSC (se vejledning i næste afsnit).
- b. Der skal dokumenteres inden for patientens kontakt (dokumentation der sker efter patienten er udskrevet eller afsluttet kommer ikke med, medmindre tidspunktet ændres så det ligger inden for kontakten).
- c. Undersøgelser og vurderinger mv. skal foregå og dokumenteres indenfor det tidsrum som indikatoren foreskriver (ex. Indikatorområde 1: Udredning – Indberettes kun for incidente patienter *inden for 12 måneder fra diagnosedatoen*).
- d. Brug RKKP satellitten i CSC som tjekliste, så det sikres, at alle indikatorer er opfyldt inden for rette tid jf. databasens indikator.

RKKP it lister: Flere steder modtager lister x 1 mdr. over de patienter som indgår i databasen. Disse lister viser et overblik over, hvilke indikatorer der er opfyldte for de enkelte patienter, og hvilke der ikke er. Det er vigtigt at vide, at der er et slip mellem de sidste overførte data til RKKP og det udtræk der fremgår af de lister man modtager ude i enhederne – derfor vil man af og til opleve at nogle data mangler.

Disse lister bør bruges vejledende og man bør først og fremmest orientere sig i RKKP satellitten samt følge FAQ a – d, for at sikre sig, at alle data er korrekt registreret og dermed overføres til RKKP.

Vejledning til brug af RKKP satellitten, brugen af de rette skabeloner til dokumentation mv.

I de følgende er det beskrevet og illustreret, hvordan RKKP satellitten fremsøges og bruges, samt hvordan der korrekt dokumenteres i forhold til de enkelte indikatorer i databasen.

Det er helt nødvendigt, at få afklaret, hvilke faggrupper der dikterer, og hvilke der skriver i CCS. Dem der dikterer, **skal** diktere ud fra de relevante skabeloner, så den sekretær der skal skrive i CCS ikke kan komme i tvivl om hvor dokumentationen skal skrives, så automatisk overførsel kan ske.

Vejledningen gennemgår systematisk de 8 indikatorområder samt prognostiske faktorer som er relevante for de indlagte patienter.

For overskuelighedens skyld gennemgås de 3 indikatorområder der vedrører de incidente patienter først (grøn skrift).

Vejledning til fremsøgning og brug af RKKP satellitten

Fremsøgning af RKKP satellitten

1. Vælg faneoverblik
2. Vælg enten Behandling eller Pleje
3. Klik på RKKP fanen

The screenshot shows the RKKP satellite interface. On the left, a list of patient records is visible. The main window displays a 'Faneoverblik' (Overview) menu with various clinical areas. A sub-menu is open, showing 'Behandling' (Treatment) and 'Pleje' (Care) options. The 'RKKP' tab is highlighted in the main interface. Red arrows indicate the steps: 1. Clicking on the 'Faneoverblik' menu, 2. Clicking on the 'Behandling' or 'Pleje' sub-menu, and 3. Clicking on the 'RKKP' tab.

Brugen af RKKP satellitten

1. Klik på RKKP indikatorer for Skizofreni
2. Klik på "tandbørsten"

I satellitten kan man få overblik over hvorvidt indikatorerne er dokumenteret.

RKKP-indikatorer for skizofreni - Kun incidente (2) [-1 år]		
RKKP-indikatorer for skizofreni (6) [-1 år]		
Indikator	Seneste registrering	Seneste resultat
Antipsykotikum, der gives vedlagsfrit	30.09.2019 09:30	1 lægemiddel
Neurologiske bivirkninger	30.09.2019 09:54	Fraværende
Søvn- og sedationsbivirkninger	30.09.2019 09:54	Til stede
Seksuelle bivirkninger	30.09.2019 09:54	Til stede
Højde		
Vægt		
Systolisk blodtryk	25.04.2019 11:20	140 mmHg
Diastolisk blodtryk	25.04.2019 11:20	80 mmHg
Familieintervention		
Selvmoordsrisiko (kun indlagte)		
GAF		
GAPD		

Satellitten er opdelt i de indikatorer der vedrører incidens i 1 år, incidens i 2 år og prævalente patienter

Frem søgning af skabeloner

1. Klik på "Skabeloner" i funktionsmenuen.
2. Her fremkommer en træstruktur med alle tilgængelige skabeloner

The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation pane and a main content area. In the navigation pane, a red arrow points to the 'Skabeloner' (Templates) menu item. The main content area displays a list of RKKP indicators, including 'RKKP-indikatorer for skizofreni - Kun incidente (2) [-1 år]', 'RKKP-indikatorer for skizofreni (5) [-1 år]', 'RKKP-indikatorer for depression (4)', and 'RKKP-indikatorer for ADHD (4)'.

Vejledning til korrekt dokumentation i CSC (indikatoropdelt)

**Indikatorområde 1: Udredning –
Indberettes kun for incidente
patienter inden for 12 måneder fra
diagnosedatoen.**

Vurdering ved speciallæge i psykiatri
eller specialpsykolog

Systematisk diagnostisk
interview/semistruktureret interview

Koden ZP0010C (voksen)/ZP0010D (børn) overføres automatisk når speciallægens 4 ciffers brugerkode fremgår af journalnotatet/journaloptagelsen/gennemgangen. **Koden ZP0012A** overføres automatisk når specialpsykologens 4 ciffers brugerkode fremgår af journalnotatet /journaloptagelsen/gennemgangen.

Koden ZZ4992 overføres automatisk, hvis der er dokumenteret i feltet "Diagnostisk interview" Feltet indgår i flere skabeloner: Journalnotat, Journaloptagelse, Gennemgang.

Diagnostisk interview

1.

2.

The screenshot shows a software interface with two main panels. The left panel, titled 'Element', contains a tree view of categories: 'Behandling', 'Kontinuationer', and 'Psykiatri'. Under 'Psykiatri', there is a list of items including 'ADHD-udredning (Børn og u', 'Andre retslige forhold', 'Andre tvangsforanstaltninge', 'Attester/Udtalelser', 'Bivirkninger til medicinsk an', 'Diagnostisk interview', 'ECT - plan for behandling', 'Graviditet, fødsel og opvæks', 'Hamiltons Depressionsskala', 'Ingen indikation for pårøren', and 'Ingen indikation for vurderir'. A red arrow labeled '1.' points to the 'Psykiatri' folder, and another red arrow labeled '2.' points to the 'Diagnostisk interview' item. The right panel, titled 'Indikationer (0)', shows a list of diagnostic interviews: 'ADIS-IV (Anxiety Disorder Interview Schedule for DSM-IV)', 'ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)', 'BAB-A (Bedømmelse af Anoreksi og Bulimi - Anamnese og Status)', 'BAB-B (Bedømmelse af Anoreksi og Bulimi - Baggrund)', 'BAB-F (Bedømmelse af Anoreksi og Bulimi - Forældreinterview)', 'BAB-S (Bedømmelse af Anoreksi og Bulimi - Somatisk)', 'CY-BOCS (Children's Yale-Brown OC Scale)', 'K-SADS (Kiddie-Sads-Present)', 'MDI (Major Depression (ICD 10) Spørgeskema)', 'OPCRIT (Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness)', 'PANNS (Positive and Negative syndrome scale)', 'PSE (Present State Examination)', and 'PANS (Scale for the Assessment of Negative Symptoms)'. The 'Diagnostisk interview' section is highlighted in blue.

Udredning af kognitiv funktion (unge under 35 år) ved psykolog (OBS inden for 24 måneder)

Koden ZZ5061 overføres automatisk, hvis der er dokumenteret i feltet "test". Feltet indgår i flere skabeloner: Journalnotat, Journaloptagelse, Gennemgang.

1.



- [-] Psykiatri
 - ADHD-udredning (Børn og u
 - Andre retslige forhold
 - Andre tvangsforanstaltninge
 - Attester/Udtalelser
 - Bivirkninger til medicinsk an
 - Diagnostisk interview
 - ECT - plan for behandling
 - Graviditet, fødsel og opvækst
 - Hamiltons Depressionsskala
 - Ingen indikation for pårøren
 - Ingen indikation for vurdering
 - Ingen indikation for vurdering
 - Kriseplan
 - Psykiatrisk særforanstaltning
 - Psykologisk undersøgelse
 - Rating scale
 - Restriktioner
 - Somatisk udredning/undersøgelse
 - Test

Test




2.



Test

BACS (The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia)
 Begavelsesvurdering
 Informationsprøven (Skizofreni)
 Kognitiv screening
 MMSE (Mini-Mental State Examination)
 NCCEA Sætningsgengivelse
 NPI
 RCFT (Rey Complex Figure Test and Recognition Trial)
 Reys 15 ord
 Reys 15 symboler
 Rorschach-testen
 TOMAL - 2
 WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale)
 TOVA (Test of Variables of Attention-Visual-Auditory)
 WISC-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children)
 WCST (Wisconsin Card Sorting Test)
 WPSSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)

Anden

<p>Vurdering af sociale støttebehov (socialrådgiver eller andet personale)</p> <p>1.  Psykiatri</p> <p>Vurdering vedrørende sociale støttebehov 2. </p>	<p>Koden ZZV005C overføres automatisk hvis der er dokumenteret i Skabelonen "Vurdering af sociale støttebehov/social udredning". Er der dokumenteret behov for social udredning overføres i stedet Koden ZZ0150BX. Begge vurderinger kan også dokumenteres via RKKP satellitten.</p> 

Indikatorområde 5.

Familieintervention – Indberettes kun for incidente indenfor de første 24 måneder fra diagnosedatoen.

Omhandler hvorvidt patientens pårørende har taget imod tilbud om kontakt med behandlende afdeling.

1.

Samtale med pårørende 2.




Hvorvidt pårørende tager imod tilbud om kontakt eller ej skal dokumenteres i Skabelonen "Samtale med pårørende"

The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation pane and a main content area. The navigation pane lists document types under 'Behandling' and 'Kontinuationer'. The main content area displays a form titled 'Samtale med pårørende - psykiatri'. The form includes a section for 'SAMTALE MED PÅRØRENDE' with two radio buttons: 'Pårørende ønsker ikke at tage imod kontakt' and 'Ikke muligt at etablere kontakt til pårørende'. Below this is a section for 'Deltagere i samtale' and 'Oplysninger fra pårørende'. The form also includes sections for 'Sygdomsindsigt' and 'Forståelse af betydningen af livsstilsfaktorer'.

Hos patienter ≥ 18 år: **Koden BVAA5** overføres automatisk hvis der er dokumenteret i skabelonen fx "resume af samtale".

Er det ikke muligt at skabe kontakt til pårørende, eller pårørende ønsker ikke kontakt, overføres **koden AWZ13B** automatisk hvis dette er dokumenteret i skabelonen (**BLÅ PILE**)

Hos patienter < 18 år: **Koden BVAA97** (forældre)/**BVAA99** (værge) overføres automatisk hvis der er dokumenteret i skabelonen.

<p>Indikatorområde 6. Psykoedukation – Indberettes kun for incidente – inden for 24 måneder efter diagnosedatoen</p> <p>Omhandler deltagelse i et manualiseret psykoedukationsforløb</p> <p>1. </p> <p>2. </p> <p>Undervisning til patient/pårørende</p>	<p>Koden BRKP1A (individuel psykoedukation) / BRKP8A (gruppe psykoedukation) / BRKP7 (psykoedukativ familieintervention i B&U) overføres automatisk hvis typen af psykoedukation samt deltagelse er dokumenteret i skabelonen "Undervisning til patient/pårørende" (BLÅ PILE)</p> 
---	---

Indikatorområde 2: Medicinsk behandling

Omhandler patienter der får vederlagsfri antipsykotika, og skal indberettes minimum 1 gang årligt.

Medicintilskud



1.



2.


Vederlagsfri antipsykotika dokumenteres i skabelonen "Medicintilskud". Under tilskudstype, findes og klikkes på "Vederlagsfri". Derefter fremkommer mulighed for at klikke af hvor mange lægemidler patienten får. Herefter vil **koden BRHA0 + tillægskoder afhængig af antal** automatisk blive overført. **Skabelonen kan også tilgås via RKKP satellitten, ligesom overblik over indberetningen fås i RKKP satellitten**

Indikatorområde 3: Bivirkninger til medicinsk behandling.

Koderne ZZ004B1A (neurologiske bivirkninger)/**ZZV004B2A** (fravær af neurologiske bivirkninger), **ZZV004B1B** (søvn- og sedationsbivirkninger) / **ZZV004B2B** (fravær af søvn- og sedationsbivirkninger)

<p>Alle 3 indikatorer indberettes minimum 1 gang årligt.</p> <p>Fravær af bivirkninger skal kodes uanset om bivirkningen er behandlet væk eller aldrig har været tilstede.</p> <p>1.</p> <p>Bivirkninger til medicinsk antipsykotisk behandling</p> <p>2.</p>	<p>ZZV004B1D (seksuelle bivirkninger) / ZZ004B2D (fravær af seksuelle bivirkninger), bliver automatisk overført når de er vinget af i skabelonen. Skabelonen kan også tilgås via RKKP satellitten, ligesom overblik ses i satellitten.</p> 
<p>Indikatorområde 4: Undersøgelse for metabolisk syndrom</p> <p>Højde og vægt indberettes ved første kontakt.</p> <p>Vægt og BT indberettes herefter minimum 1 gang årligt</p>	<p>Højde og vægt dokumenteres under fanebladet "værdier" i skabelonen "Mål og vægt", eller under KRAM screening. De seneste data (inden for de seneste 12 måneder) overføres automatisk med koden ZZ0240 + vægt i kg, samt koden ZZ0241 + højde i cm.</p>  <p>Blodtryk dokumenteres under fanebladet "værdier" i skabelonen "ABCDE værdier". De seneste data (inden for de seneste 12 måneder) overføres automatisk med koden ZZ3160 + systolisk/diastolisk værdi.</p>

	 <p>Overblik ses i RKKP satellitten</p>
<p>Indikatorområde 8: Selvmondsrisikovurdering ved udskrivelse (Senest 7 dage før udskrivelsesdatoen)</p>	<p>Koden ZZ9970FA2 overføres automatisk, når selvmordsrisikovurderingen er dokumenteret struktureret ved hjælp af skabelonen (skabelonen findes ifm journaloptagelsen, gennemgang og journalnotater):</p> 

	<p>Selvordsrisikoniveau</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ingen øget selvmordsrisiko <input type="radio"/> Øget selvmordsrisiko <input type="radio"/> Akut øget selvmordsrisiko
<p>Prognostiske faktorer</p> <p>Laveste funktions – GAF indberettes hos alle voksne patienter < 68 år, måneden op til en årlig status.</p> <p>Laveste funktions – GAPD indberettes hos alle < 18 år i måneden op til udskrivelse/ status.</p> <p>1.  Kontinuationer</p> <p>Journaloptagelse – psykiatri 2.</p> <p>3.</p>	<p>Voksne < 68 år:</p> <p>Koden ZZ5900 + værdikoden overføres automatisk når funktions GAF er dokumenteret i "GAF skabelonen", som findes som en selvstændig fane i skabelonerne: "journaloptagelse", "gennemgang" og "journalnotat" Overblik ses i RKKP satellitten</p> <p>Se nedenfor:</p>

1. → Kontinuationer

Journaloptagelse 2.

4.

3.

Børn og unge < 18 år:
Koden ZZ5901 + værdikoden overføres automatisk når funktions- GAPD er dokumenteret i "GAPD skabelonen" som findes som en del af "Rating scale" i enten skabelonen "journaloptagelse", "gennemgang" eller "journalnotat". **OBS "Rating scale" rulle menuen skal foldes ud for at komme frem til GAPD. Overblik ses i RKKP satellitten**

Journaloptagelse - psykiatri

- IDENTIFIKATION AF PATIENT
- ANAMNESE
- LIVSSTIL, FORBRUG OG AFHÆNGIGHEDER
- MEDICINANAMNESE
- SOCIALE FORHOLD
- OBJEKTIV UNDERSØGELSE
- OBJEKTIVT PSYKISK
- GRAVIDITET, FØDSEL OG OPVÆKST
- SELMORDSRISIKO
- VOLDSRISIKOVURDERING (BRØSET VIOLENCE CHECKLIST)
- UDGANG
- TOLKEBISTAND
- RESTRIKTIONER
- PSYKIATRISK SÆRFORANSTALTNING
- ANDRE RETSLIGE FORHOLD
- VISITERING
- ABSENTERING, EFTERLYSNING OG TILBAGEVENDELSE
- GAF

Global Assessment of Functioning (GAF)

Funktions GAF	Seneste registreret funktions GAF
	08.09.2013 21:43: 30
Bemærkning til funktions GAF	

Se nedenfor

Journaloptagelse - psykiatri	<input checked="" type="checkbox"/> MEDICINANAMNESE
Konferencenotat - psykiatri	<input checked="" type="checkbox"/> SOCIALE FORHOLD
Opsamlingsnotat	<input checked="" type="checkbox"/> OBJEKTIV UNDERSØGELSE
Procedurenotat - psykiatri	<input checked="" type="checkbox"/> OBJEKTIVT PSYKISK
Psykiatrisk behandlingsplan	<input checked="" type="checkbox"/> GRAVIDITET, FØDELSE OG OPVÆKST
Psykolognotat - psykiatri	<input checked="" type="checkbox"/> SELVMORDSRISIKO
Samtale med pårørende - psyk	<input checked="" type="checkbox"/> VOLDSTRISIKOVURDERING (BRØSET VIOLENCE CHECKLIST)
Smerteanamnese	<input checked="" type="checkbox"/> UDGANG
Tilsynsnotat - psykiatri	<input checked="" type="checkbox"/> TOLKEBISTAND
Tvangsrelateret notat	<input checked="" type="checkbox"/> RESTRIKTIONER
Udskrivelsesnotat - psykiatri	<input checked="" type="checkbox"/> PSYKIATRISK SÆRFORANSTALTNING
Epikrise	<input checked="" type="checkbox"/> ANDRE RETSLIGE FORHOLD
Psykiatri	<input checked="" type="checkbox"/> VISITERING
Vurderinger - lægefaglige	<input checked="" type="checkbox"/> ABSENTERING, EFTERLYSNING OG TILBAGEVENDELSE
Dialog	<input checked="" type="checkbox"/> GAF
Observationer	<input checked="" type="checkbox"/> TEST
Patientoplysninger	<input checked="" type="checkbox"/> RATING SCALE
Plan	Rating scale
Rådgivning	GAPD (Global Assessment of Psychosocial Disability)
Screeninger	GAPD score
Sekretær	Rating scale GAPD

Reference: [Den Nationale Skizofreni Database](#) (datadefinitioner, 2021)