

Trin 5: Fastsættelse af risikoniveau

Ud fra undersøgelsen af aktuelt og tidligere selvmordsadfærd, patientens suicidale tilstand, tilstedeværelsen af anamnesticke og aktuelle risikofaktorer, beskyttende forhold og risiko for svære belastninger i nær fremtid, foretages en klinisk vurdering af risikoniveau. Personen, der foretager vurderingen, skal være opmærksom på egne og andres fornemmelser i forhold til risiko for selvmord, selv om patienten er benægtende. Hvis der er tvivl om vurderingen rådføres med kollega.

Samlet konkluderes det, om der er:

- Ingen øget selvmordsrisiko
- Øget selvmordsrisiko
- Akut øget selvmordsrisiko

Er der ikke foretaget markeringer eller beskrivelse af de forhold der påvirker risikoniveauet, beskrives de i fritekstfeltet, som foldes ud.

OBS

Når dette tekstfelt benyttes, skal man være opmærksom på at indlæggelse, skærmning og andre tiltag, der er iværksat som forebyggende tiltag IKKE er beskyttende forhold som mindsker risikoniveauet. De er en intervention og bør beskrives som sådan.

Hvis man anfører "Ingen øget selvmordsrisiko" med henvisning til at patienten er indlagt, kan andet personale overse at patienten har "Øget selvmordsrisiko" og at indlæggelsen bl.a. er en forebyggende intervention.