

Bilag til instruks "Medicin – uddelegeret ordination for sygeplejersker"

ATC	Beskrivelse	Genetisk	Dispenseringsform og styrke	Indikation	Dosis	Kontraindikation	Bivirkninger
N02BE01	Pinex	Paracetamol	Tabl. 500mg Supp. 1 g Brusetabl.500mg	Svage smerter	1 g (max x 4/døgn)	Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens	
A03FA01	Primperan	Metoclopramid	Tabl. 10 mg Supp. 20 mg	Kvalmestillende Peristaltikfremmende	10 mg (max x 3/døgn) 20 mg (max x 3/døgn)	Gastro-intestinal blødning eller perforation, mekanisk tarmobstruktion. Fæokromocytom. Epilepsi. Antipsykotika-induceret tardiv dyskinesi. Samtidig behandling med levodopa.	Kraftesløshed Diarre Døsighed Konfusion Allergiske reaktioner – anafylaktisk reaktion.
A06AD65	Movicol		Pulver til oral anvendelse/ opløses i 125 ml vand	Obstipation og svær obstipation med ophobning af fæces i rectum og/eller colon	1 pulver x 1-2/døgn	Gastro-intestinal perforation, ileus,inflammatorisk tarmsygdom, toksisk megacolon, ventrikeltømningsforstyrrelse. Nyreinsufficiens, hjertesvigt (grad III og IV), leversygdom	Kvalme, opkastning, abdominalsmerter, meteorisme, diarré, flatulens, allergiske reaktioner.
A02AA04	Magnesia	Magnesiumoxid	Tabl. 500 mg	Obstipation,	2 - 3 stk. ved	Nedsat nyrefunktion Gastro-intestinal	Kvalme, opkastning, abdominalsmerter,

Bilag til instruks "Medicin – uddelegeret ordination for sygeplejersker"

ATC	Beskrivelse	Generisk	Dispenseringsform og styrke	Indikation	Dosis	Kontraindikation	Bivirkninger
				Symptomatisk ved gastro-øsofageal refluxsygdom	sengetid	perforation. Toksisk megacolon.	diarré, flatulens. Hovedpine.
A06AD11	Laktulose	Lactulose	Oral opløsning	Obstipation	15-30 ml i døgnet	Galactose- og lactoseintolerans. Gastro-intestinal perforation. Toksisk megacolon	Abdominalsmarter, meteorisme, flatulens.
A06AG10	Klyx	Klyx®, komb.	Rektalvæske, opløsning, endosis	Obstipation, tarmtømning før operation, rektoskopi, sigmoideoskopi eller røntgenundersøgelse.	120-240 ml i døgnet	Gastro-intestinal perforation/obstruktion. Toksisk megacolon, inflammatorisk tarmsygdom	Rektal blødning kan forekomme.
A06AG11	Microlax®		Rektalvæske, opløsning, endosis	Obstipation	1 enkeltosis a' 5 ml	Gastro-intestinal perforation. Toksisk megacolon.	Rektal blødning kan forekomme.
N05CF01	Zopiclon	Zopiclon "stada"	Tabl. 3,75 mg	Kortvarig behandling af søvnløshed	1 stk. før sengetid	Alvorlig søvnapnø, akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning. Svær respirationsinsufficiens. Svær leverinsufficiens. Myasthenia	Smagsforstyrrelser (bitter smag), mundtørhed. Døsighed. svimmelhed, kvalme søvnforstyrrelser
N07BA01	Nicorette	Nicotin	Depotplastre	Tobaksafvænnning.	10 mg/16 timer	Føllings sygdom	Hovedpine, kvalme,

Bilag til instruks "Medicin – uddelegeret ordination for sygeplejersker"

	Invisi				15mg/16 timer 25mg/16 timer	Forsigtighed ved allergi for plaster/kroniske hudlidelser. Lidelser i kæbeled	svimmelhed, hududslæt
	Nicorette		Medicinsk tyggegummi 2mg eller 4 mg nicotin				
	Nicorette		Inhalator 10 mg			Forsigtighed hos personer med ustabil/akut/svær astma og kronisk obstruktiv lungesygdom på grund af lokal irriation med udløsning af hoste	
A02AD01	Alminox		1 Tyggetablet indeholder: 500 mg aluminiumaminoacetat og 100 mg magnesiumoxid	Symptomatisk ved gastro-øsofageal reflukssygdom	1-3 tyggetbl./døgn	Nedsat nyrefunktion Langvarig brug af høje doser kan føre til forstyrrelser i calcium/fosfatbalancen.	Obstipation, diarré. Hypermagnesiæmi.