

Actioncard - Total knæalloplastik – opvågning

Beskrivelse

- Vanlig modtagelse
- Anæsthesisygeplejersken giver mundtlig besked – obs cave
- Patienten monitoreres
- Forbinding og evt. dræn tilses
- Yderste komprimerende forbinding fjernes ved det angivne tidspunkt
- Obs mobilitet, sensibilitet, fleksion og ekstension i fodled
- Ispose startes 20 minutter/time
- Blære scannes – SIK > 400 ml urin
- Måle temperatur
- Obs blodtype
- Der føres væskeskema. Væskebalance opgøres kl. 14, kl. 22 og kl. 06
- Blodprøver: kl. 17. Hgb + EVF
- Administrere medicin jævnfør EPJ og rammeordination
- Fragmin efter 6 timer. Ved samlet blødning > 750 ml kontakt anæstesilæge angående dosis
- Inderste forbinding fjernes efter minimum 6 timer
- Mobilisering 6 timer efter spinalblokadens ophør
- Ved stabile værdier kan monitoreringen pauseres til natten
- Kontrol af blodtryk, puls og temperatur inden kl. 23
- Personlig pleje inden kl. 23

Dag 1

- Blodprøver: medicinske væsketal kl. 7.30
- BT, puls, sat og temperatur måles
- Mobilisering af patienter, som har sen røntgentid
- Personlig pleje og morgenmad
- Administrere medicin jævnfør EPJ
- Journalen kommes i en gartnerpose, og patienten gøres klar til røntgen kontrol.