

Intravaskulære katetre på AAUH, Thisted (Pia Christiansen, AN-TH maj 2018)

Navn / emne	PVK = Perifert venekateter	Midline Kateter = perifert venekateter	PICC Line Kateter = centralt kateter
Længde	3 – 4,5 cm	8 – 15 cm	30 – 50 cm
Holdbarhed	Individuel klinisk skøn, typisk 1 – 5 dage	Op til 29 dage	Op til 1½ år
Valg af anlæggelses sted	Mindre vener på overekstremiteter foretrækkes	Større vener på armen, ofte overarmen Ultralyds vejledt	Større vene på overarmen Ultralyds vejledt
Anlæggelse	På sengeafsnit af sygeplejerske	På opvågningsafsnit af special uddannet anæstesisygeplejerske	På opvågningsafsnit af special uddannet anæstesisygeplejerske
Anvendelse	Behov for korterevarende intravenøs adgang. Medikamina som ikke er vævsirriterende. Blod	Behov for længerevarende intravenøs adgang. Vævsirriterende antibiotica. Kontrast til Ct-scanning. – dog kun F4 (Ikke F2) Blod Total Parenteral Ernæring = TPN Perifer 1300 kcal	Behov for længerevarende intravenøs adgang. Vævsirriterende medikamina og infusionsvæsker. Total Parenteral ernæring = TPN Kontrast til CT-scanning. Blod
Anvendes IKKE til	Infusionsvæsker med osmolaritet > 500 mOsm/l Infektionsvæsker med pH <5 og > 9 Total Parenteral Ernæring = TPN	Infusionsvæsker med osmolaritet > 500 mOsm/l Infektionsvæsker med pH <5 og > 9 Total Parenteral Ernæring = TPN 1100 kcal og 2200 kcal	
Røntgen kontrol	Nej	Nej	Ja
Displacering	Relativt hyppigt	Relativt sjældent	Aldrig
Flebit	Relativt hyppigt	Relativt sjældent	Sjældent
Forbindingsskift	Ved behov	Hver 7. dag	Hver 7. dag
Fixering	Steril transparent semipermeabel plaster	Statlock/griplock + Steril transparent semipermeabel plaster	Statlock + Steril transparent semipermeabel plaster
Blodprøvetagning	Bør ikke anvendes	Bør ikke anvendes	Bør ikke anvendes
Katetre der ikke er i brug dagligt	Skylles dgl med 10 ml NaCl	Skylles dgl med 10 ml NaCl	Hepariniseres, gentages herefter hver 7. dag
Seponering	Når der ikke længere er indikation for det. Træk forsigtigt i venens retning, komprimer. Dækkes af sterilt plaster	Når der ikke længere er indikation for det. Træk forsigtigt i venens retning, komprimer. Dækkes af sterilt plaster	Når der ikke længere er indikation for det. Træk forsigtigt i venens retning, komprimer. Dækkes af sterilt plaster