

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

TOKS-score	Minimums observationsinterval	Handlingsalgoritme	Plejeansvar
0	Hver 12. time	Fortsæt scoring hver 12. time. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed kunne være på baggrund af intervention, såsom ventoline eller adrenalin inhalationer eller paracetamolbehandling.	Plejepersonale
1-2	Hver 6. time	Plejepersonale ABCDE optimerer. Ved enkeltscore på 2 sparres med erfaren sygeplejerske, som vurderer behov for orientering eller tilkald af vagthavende læge. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination.	Plejepersonale
3-5	Hver 4. time	Sygeplejersken ABCDE optimerer. Ved score på 4 eller enkeltscore på 2 orienteres vagthavende læge. Lægen lægger en plan, og scoringshyppigheden kan øges.	Sygeplejerske
6	Hver 2. time	Sygeplejersken ABCDE optimerer og måler blodtryk. Vagthavende læge tilkaldes. Vagthavende læge kan konferere med pædiatrisk bagvagt efter behov. Lægen tilser barnet og lægger en plan. Scoringshyppigheden kan øges.	Sygeplejerske
7-8	Hver 1. time	Sygeplejersken ABCDE optimerer og måler blodtryk. Vagthavende læge tilkaldes. Lægen tilser barnet indenfor 30 min. og lægger en plan. Vagthavende læge konfererer med pædiatrisk bagvagt og/ eller anæstesi-læge/BAT. Børneanæstesiologisk bagvagt* adviseres. Lægen lægger en plan.	Sygeplejerske
9 eller derover	Hvert 15. minut	Sygeplejersken ABCDE optimerer og måler blodtryk. Barnet tilses af vagthavende læge straks (senest 15 min). Vagthavende læge konfererer med pædiatrisk bagvagt og anæstesi-læge/BAT. Børneanæstesiologisk bagvagt* kontaktes. Lægen lægger en plan.	Sygeplejerske

*Børneanæstesiologisk bagvagt Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland tlf. (976)62910

Uanset TOKS-score kan vagthavende læge eller anæstesi-læge tilkaldes, hvis der er bekymring for patienten.

Systematik til hurtig vurdering af bevidsthedsniveau: AVPU

- A** for Alert (= vågen og orienteret eller normal søvn)
- V** for Verbal/Voice (=reagerer på tiltale)
- P** for Pain (=reagerer på smertestimuli)
- U** for Unresponsive (=bevidstløs og reagerer ikke)

Handlingsalgoritme for AVPU

Scorer patienten **V** tilkaldes vagthavende læge, og der lægges en plan. Patienten scores hver 4. time.
Scorer patienten **P** eller **U** tilkaldes vagthavende læge og anæstesi-læge. Der lægges en plan, og det fortsatte observationsinterval fastsættes. Børneanæstesiologisk bagvagt kontaktes.

Dokumentation for lægekontakt og afvigelser fra algoritmen

Dato	Klokken	Score	Plan	Init.