



Guide til hudpleje til patienter med PEG sonder

<p>Huden: Indstikssted ved nyanlagt PEG pladesonde skal holdes tørt og gives ro til ophealing.</p> <p>Hudpleje: "Duoderm mini" anlægges på A-op. Forbindingen tilses dagligt ift. observation af infektionstegn. Forbindingen skiftes altid ved gennemsivning. Forbindingen kan fjernes efter 48 timer, men hvis den tør kan den bibeholdes op til 5 dage. Afstand mellem hud og PEG pladen skal være 2 mm. Sonden trækkes "tot", mens patienten <u>ligger ned</u>.</p>	
<p>Ved fjernelse af forbindingen "Duoderm mini"</p> <p>Huden: Normal hud, ingen rødme eller sivning fra stoma Ingen forbindelse påsættes.</p> <p>Hudpleje: Ved behov for at beskytte huden kan der lægges "Nonwoven swaps" mellem plade og huden. Daglig afvaskning gerne i brusebad. Huden lufttørres efter badet.</p>	
<p>Huden: Ved begyndende irritation af hud under pladen ved PEG sonden.</p> <p>Hudpleje: "Nonwoven Swaps" (1 lags) kan lægges mellem plade og hud. Afstand 2 mm. Sonden trækkes "tot", mens patienten <u>ligger ned</u>. "Nonwoven swaps" skiftes hyppigt og altid ved gennemsivning. Vigtigt at infektionssted ved stoma holdes tørt. Daglig afvaskning gerne i brusebad. Huden lufttørres efter badet.</p>	

Huden: Lidt rødme og irriteret hud svarende til kanten af PEG pladen.

Hudpleje:

Afstand 2 mm mellem plade og hud. Sonden trækkes "tot", når patienten ligger ned.

Daglig afvaskning. Det røde område smøres med

1 valg: Mildison lipid 1% creme

Aftager rødmen ikke vælges

2 valg: Betnovat salve

(Betnovatsalve kræver udtrapning).

Benyt et tyndt lag creme /salve x 1

dagligt. Forbinding "Mepilex lite" påsættes mellem plade og stoma.

Skiftes ved gennemsvivning.



Mildison/Betnovat bestilles via sygehusapoteket

Huden: Voldsom rødme svarende til hele PEG pladen. Huden kan være tør evt. med hvide belægninger

Hudpleje:

Afstand 2 mm mellem plade og hud. Sonden trækkes "tot".

Daglig afvaskning. Det røde område smøres med Betnovat salve x1 dagligt.

Aftager rødmen ikke kan det være svampeinfektion

Svampebehandling: Betnovat

Chinoform (kræver lægeordination)

Huden aflastes med "Mepilex lite".




Huden: Sivning fra stoma, huden er fugtig og rød pga. sivning.

Hudpleje:

Undersøg om PEG sonden sidder korrekt. Fikser pladen med blå sikkerhedsklemme.

Ved fortsat sivning kan A-kir sygeplejersker kontaktes (alle hverdage 97661101).

Absorberende forbinding lægges ovenpå pladen, skiftes x fl dagligt ved gennemsvivning.



Maj 2019 :Kirurgisk sygeplejerske i A-ambulatorium Ingeborg Binderup, Sårsygeplejerske Camilla Leerskov Sørensen, Ernæringssteamet i Stråleterapien og Udviklingskoordinator for Ernæring Lotte Boa Skadhauge