

Actioncard ved hjertestop

– Aalborg UH Syd

Kardiologisk bagvagt

- **Medbring ekko-apparat** og foretag fokuseret bedside ekko ved rytmefejl på max 10 sekunder (start subxiphoidt).
- **Støt teamlederen** (kardiologisk forvagt) blandt andet med fokus på:
 - Kvalitet af hjertemassage og behov for mekanisk hjertemassage (LUCAS)
 - IV/IO adgang
 - A-gas vurdering
 - Kapnografi vurdering
 - Reversible årsager (4H/4T)
 - Behandlingsvarighed/behandlingsloft
 - Overvej VAM-IHCA
- Overvej tidligt, allerede efter ca. 3-5 rytmefejl, om patienten kunne være kandidat til CPS ved behandlingsrefraktært stop og aktivér CPS-hold ved behov via S1koordinator (64818).
- Efter succesfuld genoplivning indgå i dialog med Anæstesien om stamafdeling og initial fokuseret udredning alt efter formodet ætiologi f.eks. med KAG, CT cerebrum/thorax, biokemi og bedside ekko.
- Overvej terapeutisk hypotermi ved vedvarende bevidstløshed.

Revideret feb. 2020 af Maja Broen og Jacob Moesgaard Larsen