

Kengrexal™ - Doseringsvejledning

Kengrexal™ administreres som en bolusdosering og efterfølges straks af en intravenøs infusion.

Trin 1	Bolusdoseringen udtages fra den blandede opløsning (se vejledning) ALDRIG direkte fra hætteglasset. Bolusdosis skal administreres hurtigt (<1 min) ved manuel injektion eller pumpe. Hele bolusdosis skal være administreret før PCI-proceduren indledes.
Trin 2	Start infusionen STRAKS efter administration af bolus og fortsæt i mindst 2 timer eller under hele proceduren, hvad end er længst. Infusionen kan, efter lægeligt skøn, fortsætte op til 4 timer.

Patientvægt	Trin 1 Bolus 30 mikrogram/kg	Trin 2 Infusion 4 mikrogram/kg/min i 2-4 timer
Kg	ml~mg	mL/time
38-42	6 ~ 1.2	48
43-47	7 ~ 1.4	54
48-52	7,5 ~ 1.5	60
53-57	8 ~ 1.6	66
58-62	9 ~ 1.8	72
63-67	10 ~ 2.0	78
68-72	10,5 ~ 2.1	84
73-77	11 ~ 2.2	90
78-82	12 ~ 2.4	96
83-87	13 ~ 2.6	102
88-92	13,5 ~ 2.7	108
93-97	14 ~ 2.8	114
98-102	15 ~ 3.0	120
103-107	16 ~ 3.2	126
108-112	16,5 ~ 3.3	132
113-117	17 ~ 3.4	138
118-122	18 ~ 3.6	144
123-127	19 ~ 3.8	150
128-132	19,5 ~ 3.9	156
133-137	20 ~ 4.0	162
138-142	21 ~ 4.2	168
143-147	22 ~ 4.4	174
148-152	22,5 ~ 4.5	180