

## Ptt. obs. DVT i skadestue eller akut modtagelse, Aalborg Universitetshospital

- Ved klinisk mistanke om venøs tromboemboli (arm eller ben) hos ikke akut påvirkede patienter og uden mistanke om svært nedsat nyrefunktion (eGFR<20) påbegyndes:
  1. Behandling med tbl. Xarelto 15 mg x2 eller Eliquis 10 mg x2.
  2. Medicinsk Dagafsnit i Farsø kontaktes jf. nedenstående.
  3. Patienten udskrives medgivet det nødvendige antal tabletter **(ALDRIG med recept)**.
- Patienter, hvor lungeemboli mistænkes, er akut påvirkede, eller har formodet e-GFR <20 skal henvises til medicinsk visitator, Aalborg Universitetshospital mhp indlæggelse.

### Forløb i dagtid

Mandage – torsdage kl. 8-16  
Fredage kl. 8-15

- Der tages telefonisk kontakt til Medicinsk Dagafsnit, Farsø ☎ **22631422**, hvor patienten meldes og får en tid enten samme eller næste hverdag til videre udredning og behandling.

### Forløb i aften/nat/weekend og helligdage

- Henvises fra skadestue/AMA til Medicinsk Dagafsnit, Farsø via Webpas. HUSK pt. **data og telefonnummer**. Patienten vil blive indkaldt telefonisk næste hverdag inden kl. 10 til fortsat udredning og behandling.
- Farsø arrangerer transport.
- Ved bekymring om forhøjet se-kreatinin og flere dages behandling før ultralyd, henvises til medicinsk visitator, der så overtager behandlingsansvaret.