

Anamnese

- Synkoper.
- Funktionsdyspnø (kronotrop inkompetence).
- Tidligere AMI/ Kendt iskæmisk hjertesygdom.

Tidligere kardielt

CABG, PCI, Tidligere abnorm Hjerter-CT, EKKO eller lign. abnormt EKG.

Risiko faktorer

Hypertension, hyperlipidæmi, familiært disponeret, Diabetes Mellitus, Rygning.

Lægefaglig vurdering Akutmodtagelsen

Konferer altid med medicinsk bagvagt, og ved mistanke om primær kardiologisk sygdom konfereres efterfølgende altid med kardiologisk bagvagt i Aalborg 97 66 44 61

Til Hjertecenter Aalborg

- Akut pacemaker behov med påvirket hæmodynamik.
- 3. grads AV-blok.
- 2. grads AV-blok Mobitz type 2 eller avanceret 2. grads AV-blok.
- Svær, symptomgivende sinusbradykardi – evt. ved intoksikation.

Til Hjertecenter Aalborg

- Patienter med mistanke om symptomgivende bradykardi.
- Patienter med mulig pacemakerindikation:
- Symptomatisk sinusbradykardi.
- Alternierende højre- og venstresidigt grenblok.
- Synkope og bifascikulært blok (venstresidigt anteriort/ posterioert hemiblok og højresidigt grenblok).

Til Akutmodtagelsen

- Patienter med stabil og asymptomatisk bradykardi.
- 1. grads AV-blok.
- 2. grads AV-blok Mobitz type 1.
- Sinusbradykardi.

Patienterne bør overflyttes lægeledsaget med transkutant pacemakerberedskab og evt. isoprelinfusion.