

FLOW-CHART for behandling med Ivlg (+/-prednison)

Før konception	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 10	Uge 12	Uge 14	Uge 16	Uge 18	Uge 20	Uge 22	Uge 24	Uge 26	I alt antal infusioner i graviditet
≥ 3 GT efter IVF/ICSI/FER. Alle GT < uge 7. Prednison fra 1. IVF/ICSI dag til uge 8														
X	X	X	X	X										4
≥ 3 GT efter IVF/ICSI/FER. ≥1 GT ≥ uge 7. Prednison fra 1. IVF/ICSI dag til uge 8														
X	X	X	X	X	X	X	X							7
≥ 4 konsekutive GT < uge 12 efter levende- eller dødfødsel. Spontan konception														
	X	X	X	X	(X)	(X)	(X)							4-7
≥ 2 tilfælde af uforklaret intrauterin FD ≥ uge 12 (levende ved NFS), ingen autoimmun sygdom														
	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	8-13*
≥ 3 GT < uge 12 eller ≥ 2 intrauterine FD ≥ uge 12 og klinisk autoimmun sygdom														
(X)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13

GT = graviditetstab; FD = fosterdød

*Sidste infusion ved gestationsalderen for seneste FD

** Infusion hver 3. måned før konception hvis patienten har GT < uge 12