

## Fødepidural: Epidural analgesi til vaginal fødsel

Label \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_ KL: \_\_\_\_\_

Projektpatient

Anlæggelse af epiduralkateter

Niveau \_\_\_\_\_

LOR: \_\_\_\_\_

Blod \_\_\_\_\_

Kateter til mærke \_\_\_\_\_

Spinalvæske \_\_\_\_\_

Paræstesier \_\_\_\_\_

Læge: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_

Test Lidokain 2 % antal ml \_\_\_\_\_

### Bolus

Ropivacain 5 mg/ml 3 ml + NaCl isoton 7 ml, eller evt.:

Kl: \_\_\_\_\_ Læge \_\_\_\_\_

Ropivacain 5 mg/ml 3 ml + Sufenta 5 mikrogram/ml 2 ml + NaCl isoton 5 ml

## CaddSolis pumpe og medicinblanding

Medicinblanding:

Ropivacain 1,0 mg/ml med Sufentanil 0,4 µg/ml i et totalt volumen på 112 ml

Projektmedicin

- Følg opsætnings algoritmen på skærmen, pumpen er forprogrammeret.
- Programmering:
- Start bolus 0
- Programmeret intermitterende bolus 9 ml
- Bolus interval 45 min
- PCEA 5 ml
- Lockout 10 min
- Maksimal dosis 25 ml/time

-----  
Efedrin 5-10 mg ved BT \_\_\_\_\_ Læge: \_\_\_\_\_

Patienten instrueres i at anvende PCEA. Ved manglende effekt efter 30 min. kontaktes anæstesilæge (41113)

Original til anæsthesisekretariatet

## Fødepidural - Epidural analgesi til vaginal fødsel

### Indikation

Stilles af obstetrisk læge/jordemoder. Denne kontakter vagthavende på anæstesiaafdelingen (41113 i vagttid og 41080 i dagtid). Inden anæstesilæge kaldes, informeres den fødende om mulighed for bivirkninger (paræstesier/spinalt anslag/hovedpine)

### Kontraindikationer

Koagulopati (TBS < 80.000 eller abnorm APTT eller PP/INR), AK-behandling.

### Anlæggelse af epiduralkateter

Velfungerende drop med Ringer/NaCl 0,9 %.

Blodtryk, puls og respirationsfrekvens måles og noteres i Clinical Suite.

Epiduralkateter anlægges på vanlig vis siddende eller i venstre sideleje.

Altid midtlinieteknik. Testes med Lidokain 2 % 2,5 ml.

### Monitorering

Puls, Blodtryk og respiration hvert 5. minut i 20 minutter efter loadingdosis. Den fødende holder sengen i denne tid, og kan herefter være oppegående i udvidelsesfasen, herunder måles blodtryk og puls hver time(og ved behov).

Epikateteret kan, hvis det er velfungerende, anvendes til eventuelt sectio grad II og III.