

**Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejersker på:
Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium, Endoskopi Hobro, Thisted & Aalborg**

Nedenstående delegerede ordinationer er oprettet i medicinmodulet og kan fremsøges i medicinmodulet.

Lægemiddel

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Inj. Midazolam	1 mg	Sedation	1 - 7,5 mg	i.v.	24 timer	Alder, høj ASA score, Misbrug, Nedsat nyrefunktion
Inj. Rapifen	0,5 mg	Sedation	0,25 – 1,5 mg	i.v.	24 timer	Alder, høj ASA score, Nedsat nyrefunktion
Inj. Flumazenil	0,1 mg	Antidot til Midazolam	0,3 mg Supplere med 0,1 mg i.v.	i.v.		
Inj. Naloxon	0,4	Antidot til morfica	0,4 mg. i.v. evt supplere med 0,2 mg i.v.	i.v.		Obs. ved patienter i behandling med depotmorfin. Da dette ophæves.
Inj. Buscopan	10 mg	Peristaltik	10-30 mg	i.v.	4 timer	Alder, AFLI, Tackycardi, Ileus, Stenose GI, Mega-colon
Inj. Glucagen	1 mg	Peristaltik	0,33-1 mg	i.v.		Diabetes mellitus
Supp. Diclodan	100 mg	Profylakse	100 mg	p.r.		Allergi
Tbl. Dulcolax	5 mg	Obstipation	5-10 mg 30 mg som suppl. udrensning	p.o		GI obstruktion, Ileus, IBD
Tbl. Magnesia	500 mg	Obstipation	1-2 g	p.o		Nedsat nyrefunktion - GFR <30
Pulver Movicol		Obstipation	1-2 breve	p.o		GI obstruktion, Ileus, IBD
Mixt. Laktolose		Obstipation	15-30 ml dgl.	p.o		GI obstruktion, Ileus, IBD
Tbl. Imodium	2 mg	Diarre	2-4 mg (max16 mg)	p.o		Diarre med feber og blod. Ileus, Aktiv IBD

Spray Xylocain	10 mg	Lokalbedøvelse	1-3 pust	p.o./spray i svælget (kutanspray)	1-2 time	
Pulver Husk m. kalk		Diarre	15-30 g dgl.	p.o		
Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Inj. Innohep		Tromber, profylakse	Efter DSTH applikation	s.c		Nedsat nyrefunktion - GFR <30
Tbl. Paracetamol	500 mg	Smerter	1 g	p.o	6 timer	Alvorlig leverinsufficiens
Tbl. Ibuprofen	400 mg	Smerter	400 mg	p.o	6-8 timer	Allergi, hjerteinsuff, akut blødning, IBD
Creme Mildin Lipid	1 %	Hypergranulation		kutant		
Avoca stift		Granulomer stomi v.		kutant		
Methylrosanilin	0,5 %			kutant		
Locoid kutan liniment	0,1 %	Dermatitis		kutant		
Locoid creme	0,1 %	Dermatitis		kutant		
Lamazil Once	10 mg/g	Dermatitis		kutant		