

**Bilag 1: Abstinensscorenschema, Alkoholabstinenser og delir hos voksne fremkaldt af alkoholabstinenser (delirium tremens)
Fællesregional retningslinje Region Nordjylland 2018**

I skema 1 scores patienten med 0-4 point for hver af de anførte parametre/symptomer.

Værdierne indføres i skemaet på forsiden og summeres på tværs

Skema 1	Puls	Temp.	Motorisk uro	Sved	Tremor	Orientering	Angst	Hallucinationer	Opkastninger
0	<90	<37	Ingen	Normal	Ingen	Fuldt orienteret	Ingen	Ingen	Nej
1	90-110	37.1-37.5	Indre uro/anspændt	Huden varm/fugtig	Konstant let	Orienteret i personlige data, usikker i tid, sted	Let angst	Periodisk, struktureret	Ja
2	>110	37.6-38.5	Omkring-farende/pillende	Lokaliserede svedperler	Konstant grov	Orienteret i personlige data men ikke tid og sted	Frygt, panik	Periodisk, ustruktur	
3		>38.6		Hele kroppen våd		Usikkert orienteret i personlige data		Konstant, uafledelige	
4					Totalt desorienteret				

Skema 2	Abstinensgrad	Symptomer
0-3	Grad 0: Mild abstinensstilstand	Indre uro, let tremor
4-6	Grad 1: Fysisk abstinensstilstand	Almen utilpashed, uro og rastløshed. Hjerteranken, tremor, svedudbrud. Søvnbesvær og ofte angst.
7-12	Grad 2: Prædelirøus tremens	Grad 1 + hallucinationer (ofte kryb og smådyr)
>12	Grad 3: Delirøus abstinensstilstand/Delirium tremens	Grad 2 + desorientering og bevidsthedsplumring

I skema 2 aflæses abstinensgraden

Denne værdi indføres også i skemaet på forsiden.

Vedr. valg og dosering af medicin se behandlingsalgoritme bilag 2 til PRI Alkoholabstinenser og delir fremkaldt af alkoholabstinenser (delirium tremens) ([PRI-link](#)).

Angiv i skemaet på forsiden hvornår behandlingsmålene er nået.