

## Bilag 1. Rammeordinationer for social- og sundhedsassistenter på Akut Modtageafsnit (AMA)

Nedenstående delegerede ordinationer er oprettet i medicinmodulet, som standardordinationer. Standardordinationerne kan fremsøges i medicinmodulet ved søgning på bl.a. "delegeret".

I alle tvivlsspørgsmål skal ansvarlig teamsygeplejerske kontaktes.

### Adrenergika (sygdomme i næse og bihuler)

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Zymelin spray	1 ml indeholder 1 mg xylometazolinhydrochlorid	Nasal obstruktion ved akut viral rhinosinuit og akut postviral rhinosinuit.	1 spray i tillukket næsebor. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage.	E	1 dr. i hvert næsebor i max 10 dage.	

### Analgetika til voksne

Der skal altid laves en smertevurdering inkl. VAS score.

Se instruks:

[Smertemanual;](#)

[Smertebehandling af patienter med nyrepåvirkning;](#)

[Postoperativ smertebehandling;](#)

### Enteralt

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Paracetamol OR	500 mg	Svage smerter	500- 1000 mg	E	4-6 timer	Alvorlig leverinsufficiens. Ved nedsat nyrefunktion (GFR < 30) øges dosisintervallet.
Paracetamol SUP	1000 mg	Svage smerter	1000 mg	E	4-6 timer	Alvorlig leverinsufficiens. Ved nedsat nyrefunktion (GFR < 30) øges dosisintervallet.

## Antacida

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Alminox OR	500 mg/ 100 mg	Gastro- øsofageal reflukssygdom	1- 2 tyggetabletter	E		Dosisreduktion ved GFR 0-30 ml/min

## Anxiolytikum

Ved alkoholabstinenstilstande og delirøs abstinensstilstand

Gives forud gået af abstinensscoring ([Alkoholabstinenstilstande og delirøs abstinensstilstand](#))

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Klopoxid OR	25mg	Alkohol abstinenser	25-50 mg	E	Lang halvering stid (10- 48 t	Alkohol eller sovemiddelforgiftning Svær respirationsinsufficiens Svær leverinsufficiens Dosisreduktion ved svær nyreinsufficiens

## Laksantia:

Se følgende instrukser for behandling af obstipation hos voksne: [Obstipation, kronisk](#) ; [Klinisk retningslinje for behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendt mavetarmsygdom](#);

## Osmotisk virkende laksantia

Osmotisk virkende laksantia trækker væske ud af tarmen og letter dermed passagen gennem tarmen. Kræver stor væskeindtagelse.

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Gangiden Pulver	1 brev	Obstipation. Anvendes ved immobilisation eller i tilfælde, hvor lind afføring er ønsket, og hvor kraftig brug af bugmuskulaturen er	1 brev	E	Virkingen indtræder efter 12-24 timer.	Ileus og mistanke om ileus. Gastro- intestinal perforation Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom Toksisk megacolon Ventrikeltømningsforstyrrelser.

		uønsket fx efter abdominaloperation				
Laktulose mixt	1 ml indeholder 650 mg laktulose	Obstipation. Anvendes ved immobilisation eller i tilfælde, hvor lind afføring er ønsket, og hvor kraftig brug af bugmuskulaturen er uønsket fx efter abdominaloperation.	15 ml – ofte bivirkninger i form af flatulens, meteorisme og mavesmerter.	E	Virkningen indtræder efter 2-3 dage.	Ileus og mistanke om ileus. Gastro- intestinal perforation Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom Toksisk megacolon Ventrikeltømningsforstyrrelser. Galactoseintolerans
Magnesia OR	500 mg	Obstipation. Anvendes ved immobilisation eller i tilfælde, hvor lind afføring er ønsket, og hvor kraftig brug af bugmuskulaturen er uønsket fx efter abdominaloperation.	1000 mg til sengetid	E	Virkningen indtræder efter 6-8 timer.	Ileus og mistanke om ileus. Nedsat nyrefunktion pga risiko for magnesiumforgiftning. Gastro- intestinal perforation Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom Toksisk megacolon Ventrikeltømningsforstyrrelser.

### Øjenmidler

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Vikøse øjendr.	1 ml indeholder 3,5 mg hypromellose	Nedsat tåre- eller slimproduktion i øjet.	1-2 dråber i øjet	E		Forsigtighed ved brug af kontaktlinser.
Kloramfenikol øjensalve	1 g indeholder 10 mg chloramphenicol.	Øjeninfektion	Appliceres i inficeret øje	E		Allergi overfor Kloramfenikol

## Nikotinsubstitution

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Nicorette plaster	15 mg/ 16t. 25 mg/16 t.	Rygeophør	Personer, som ryger under 20 cigaretter dagligt – 15 mg/16. t Personer, som ryger over 20 cigaretter – 25 mg/ 16. t.	E	16 timer	Føllings sygdom pga. indhold af fenylalatin.

## Overfladeanæstesi

Se instruks: [Anvendelse af Emla-creme til forebyggelse af smerter ved venepunktur eller lignende](#)

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Liprocani (EMLA)	25 + 25 mg/ g	Lokal analgetikum til overfladebedøvelse.	Børn under 12 år: Mindre indgreb, ca. 1 g/ 10 cm <sup>2</sup> : Appliceres i et tykt lag på huden mindst 1 time før indgrebet og dækkes med forbinding	E	0,5 – 2 timer	

## Øjenmidler

Præparat og adm. vej	Styrke	Indikation	Dosering	Administrationstype	Varighed evt.	Kontraindikationer
Vikøse øjendr.	1 ml indeholder 3,5 mg hypromellose	Nedsat tåre- eller slimproduktion i øjet.	1-2 dråber i øjet	E		Forsigtighed ved brug af kontaktlinser.
Kloramfenikol øjensalve		Øjeninfektion		E		Allergi overfor Kloramfenikol

	1 g indeholder 10 mg chloramphenic ol.		Appliceres i inficeret øje			
--	---	--	-------------------------------	--	--	--