

Forløbsbeskrivelser for indlæggelse i psykiatrien

Tværrregional beskrivelse af somatisk undersøgelse, misbrugs- og bivirkningscreening

Undersøgelse	Indhold
Somatisk undersøgelse	<p>Somatiske anamnese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidligere og / eller nuværende kendt somatisk sygdom • Systematisk interview om aktuelle somatiske symptomer • Allergi og intolerans <p>Objektiv somatisk undersøgelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almentilstand • Ernæringstilstand – herunder højde, vægt og taljeomfang • Vitalværdier • Øjne • Cavum oris • Hals • St.c. • St.p. • Abdomen • Ekstremiteter • Hud • Neurologisk undersøgelse (omfang afhængig af anamnese) • Suppleres med relevante undersøgelser baseret på symptomer oplyst i anamnesen og objektive fund. <p>Parakliniske undersøgelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle patienter bør som minimum screenes for metabolisk syndrom. Behovet for øvrige parakliniske undersøgelser, inkl. Billeddiagnostik baseres på anamnese, objektiv undersøgelse, medicin, og om der foreligger relevante tidligere prøvesvar. <p>Den somatiske undersøgelse udvides, såfremt der mistænkes eller erkendes somatisk sygdom / symptomer, f.eks. med somatiske tilsyn eller billeddiagnostisk udredning (CT-, MR-scanning mm.)</p>
Urinscreening ifm. somatisk undersøgelse	<p>Urinscreening</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urinundersøgelse med stix (glucose, ketoner, blod, pH, protein, nitrit, leucocytter, hCG).

Undersøgelse	Indhold
Misbrugs-screening	<p>Misbrugsscreening: I forbindelse med KRAM-screening, foretages en screening af, om patienten drikker over de af Sundhedsstyrelsen anbefalede genstandsgrænser. Desuden screenes patienten for misbrug af narkotika, herunder hash, amfetamin, opiater, kokain, ecstasy og benzodiazepiner - via anamnese (f.eks DUDIT) samt evt. urinscreening.</p> <p>Der screenes ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indlæggelse • Under et indlæggelsesforløb, ved mistanke om misbrug. • Når der ordineres et lægemiddel, som kan have interaktion med et stof, som patienten misbruger. • Psykiatriske eller somatiske symptomer eller lidelser, som kan være forårsaget af misbrug • Uforklarlige, uspecifikke psykiske symptomer, så som humørsvingninger, irritabilitet, aggressivitet, affektlabilitet, lav impuls kontrol, koncentrationsbesvær, hukommelsessvækkelse ukarakteristiske angstsymptomer. • Uforklarligt funktionstab (uddannelse, arbejdsmæssigt og socialt) • Kriminalitet, uforklarlige trafikuheld og tilskadekomst <p>Misbrugsanamnese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidligere og nuværende rusmiddelindtag, alkohol og/eller medicinmisbrug. • For hvert rusmiddel oplysning om: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alder for førstegangsb brug ○ Indtagelseshyppighed og tidspunkt for sidste indtagelse ○ Dispenseringsform/måde og anslået forbrug pr uge (gram/ genstande). ○ Tilfælde af forgiftningstilstand/overdosis (uheld/suicidalt øjemed) ○ Perioder uden indtagelse af det pågældende stof ○ Abstinenssymptomer, herunder tidligere kramper eller delir • Tidligere behandling for misbrug <ul style="list-style-type: none"> ○ Hvilken form for behandling og resultatet heraf • Risikoadfærd <ul style="list-style-type: none"> ○ Risikoadfærd (deler kanyler, ubeskyttet sex/ prostitution eller kriminalitet) • Somatisk anamnese <ul style="list-style-type: none"> ○ Komplikationer til misbrug (abscesser, tromboser, dårlig ernæringstilstand m.m.) ○ Hepatitis/HIV status <p>Ved abstinenssymptomer grundet alkohol- og/eller medicinmisbrug: Behandlingen følger retningslinje for abstinensbehandling. Patientens abstinenssymptomer vurderes min. hver time indtil effekt (søvn eller ophør af fysiske abstinenssymptomer), f.eks. via The Withdrawal Syndrome Scale for Alcohol (WSA).</p>
Urinscreening ifm. undersøgelse for misbrug:	<p>Urinscreening ifm. undersøgelse for misbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urinscreening for misbrug (kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy, cannabis, metadon, opiater, benzodiazepiner) Eks.vis ved brug af Multi-Drug-screen

Undersøgelse	Indhold																																																															
Bivirknings-screening	<p>Bivirkninger ved brug af antipsykotisk medicin: Følgende værdier og bivirkninger ved behandling med antipsykotika (for clozapin er der specielle krav til monitorering) skal monitoreres med følgende intervaller. Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til voksne:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Før behandling</th> <th>2 uger</th> <th>4 uger</th> <th>8 uger</th> <th>12 uger</th> <th>Årligt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anamnese</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Vægt</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>BMI</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Taljeomfang</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Blodtryk</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>HbA1c</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Plasma lipider</td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>EKG</td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>Derud over screenes for følgende bivirkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Psykiske: Asteni/sedation, Depression, Akatysi, Indifferens • Neurologiske: Dystoni, Parkinsonisme, Hyperkinesi, Tremor, Akatysi • Autonome: Hypersalivation/ hyposalivation, Kvalme/opkastning, Obstipation, inkontinens/ Vandladningsbesvær, Ortostatisk svimmelhed • Andre: Vægtøgning, Amenore, Gynækomasti/galaktoré, Seksuelle bivirkninger <p>Præparatspecifik monitorering: Bivirkningsmonitorering følger retningslinjerne fra RADS</p>		Før behandling	2 uger	4 uger	8 uger	12 uger	Årligt	Anamnese	+	+	+	+	+	+	Vægt	+	+	+	+	+	+	BMI	+	+	+	+	+	+	Taljeomfang	+					+	Blodtryk	+				+	+	HbA1c	+				+	+	Plasma lipider	+	+			+	+	EKG	+	+			+	+
	Før behandling	2 uger	4 uger	8 uger	12 uger	Årligt																																																										
Anamnese	+	+	+	+	+	+																																																										
Vægt	+	+	+	+	+	+																																																										
BMI	+	+	+	+	+	+																																																										
Taljeomfang	+					+																																																										
Blodtryk	+				+	+																																																										
HbA1c	+				+	+																																																										
Plasma lipider	+	+			+	+																																																										
EKG	+	+			+	+																																																										