

# TJEKLISTE

Bilag til PRI dok. [Genoplivning og og fravalg af genoplivningsforsøg \(dok.id.25711\)](#)

## Fravalg af genoplivningsforsøg

Lægen kan beslutte, at der ikke skal forsøges genoplivning ved hjertestop, hvis patienten er alvorligt syg eller døende, og videre behandling vurderes at være udsigtsløs.<sup>1</sup>

Fravalg af genoplivning skal overvejes, når:


- Patienten er uafvendeligt døende
- Genoplivningsforsøg kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser vurderes at være meget alvorlige

Fravalg af genoplivning kan også foretages af patienten selv i den aktuelle sygdomssituation.

Vær opmærksom på Behandlings- og livstestamenter.

## Registrering af fravalget

Dokumentationen af det forudgående fravalg af genoplivning består af to skridt:



Det er IKKE nok, at beslutningen dikteres som journalnotat.

## Det videre patientforløb efter beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg

### Intern transport (bl.a. til diagnostiske enheder):

- Beslutning om fravalg skrives i henvisningen.
- Telefonisk kontakt til modtagende afsnit, hvis patienten ikke ledsages af personale fra stamafsnittet.
- Portør bedes (ifbm. bestillingen) tage kontakt til personalet ved afhentning, hvor information om fravalg overbringes mundtligt til portør.
- Ved modtagelse af patienten dobbelttjekkes fravalget i epj under **Behandlingsniveau**.

### Ekstern transport:

Anvend blanket fra PRI dokumentet:

[Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland \(Dok. ID. 25823\)](#)

### Sektoroverdragelse:

- Fravalget er gældende ved sektorskift.
- Alle beslutninger om fravalg af genoplivningsforsøg, herunder revurderinger, overleveres skriftligt mellem de forskellige behandlingssteder, fx i henvisningen eller via epikrisen.
- I akutte situationer kan beslutningen meddeles mundtligt, men følges op skriftligt.

### **Praktiserende læge**

Beslutning viderefremmes via epikrisen og epikrisen markeres med anbefaling om opfølgning – grøn epikrise. Vær opmærksom på, at patientens øvrige situation kan foranledige en gul eller rød epikrise.

### **Plejepersonalet i hjemmesygeplejen, plejecenter mv.**

Beslutning viderefremmes direkte telefonisk og også skriftligt ved, at journalnotatet **Behandlingsniveau** sendes med i **Plejeforløbsplanen** eller som et **korrespondancebrev** til hjemmeplejen.

<sup>1</sup> Se mere i: [VEJ nr. 9934 af 29/10/2019 om genoplivning](#)