

## Blandingsvejledning Anæstesi Basis V.1

<b>Efedrin</b>	<p>1 ml efedrin (50mg/ml = 1 ampul) blandes med 19 ml natriumchlorid.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver <b>2,5 mg/ml</b></p>
<b>Noradrenalin 10</b>	<p>1 ml Noradrenalin (=1mg) blandes med 100ml isot. Glukose eller natriumchlorid</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver <b>10 µg/ml</b>.</p>
<b>Phenylephrin (metaoxedrin)</b>	<p>2ml (1 mg/ml = 2 ampuller) blandes i 18ml natriumchlorid.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver <b>0,1 mg/ml</b></p>
<b>Propofol</b>	<p>Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul <b>10 mg/ml</b></p>
<b>Remifentanil</b>	<p>5mg (pulver til opløsning) blandes med 100ml natriumchlorid.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver <b>50 µg /ml</b>.</p>
<b>Rocuronium</b>	<p>Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul <b>10 mg/ml</b></p>