

Blandingsvejledning Intensiv Børn V.1

| | |
|------------------------------------|---|
| Adrenalin 10µg/ml | <p>1 ml Adrenalin (=1mg) blandes med 100ml isot. Glukose eller natriumklorid.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 10 µg/ml.</p> |
| Amiodaron | <p>600 mg Amiodaron (= 12 ml) blandes med 38 ml isoton glucose.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 12 mg/ml.</p> |
| Antibiotikum | <p>Blandes i henhold til antibiotika vejledning.</p> |
| Calciumchlorid | <p>Bruges uforyndet. Koncentration fra ampul 0,5 mmol/ml</p> |
| Clonidin (catapressan) | <p>5ml (a 150µg/ml) = 750 µg blandes med 45 ml NaCl .</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 15 µg/ml.</p> |
| Fentanyl | <p>Bruges uforyndet. Koncentration fra ampul 50 µg/ml</p> |
| Fosfat stærk (Addiphos) | <p>20 ml Addiphos (40 mmol fosfat) blandes med 30 ml isoton NaCl eller glukose.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 0,8 mmol/ml</p> |
| Fosphenytoin (Pro-Epanutin) | <p>Fosphenytoin blandes efter vægt (se venligst skema iht instruks.) Blandes 1:1 med Natriumchlorid.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 25 PÆ(mg)/ml</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Furosemid (Furix) | Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 10 mg/ml |
| insulin | 50IE insulin blandes i 50ml Natriumchlorid. Koncentration af infusionsblanding bliver 1 IE/ml |
| isoprenalin | 2,5 ml (á 1 mg/ml) = 2,5 mg blandes med 47,5 ml NaCl. Koncentration af infusionsblanding bliver 50 µg/ml |
| Ketamin 25mg/ml | Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 25 mg/ml |
| Labetalol (trandate) | Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 5 mg/ml |
| Levetiracetam | Ønskede mængde levetiracetam (af 100mg/ml) blandes i 100ml NaCl. |
| Magnesiumsulfat stærk | 10 ml infusionskoncentrat (20 mmol) blandes med 40 ml isoton natriumchlorid eller glukose. Koncentration af infusionsblanding bliver 0,4 mmol/ml . |
| Midazolan | Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 5 mg/ml |
| Morfin 1mg/ml | Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 1 mg/ml |

| | |
|---|--|
| <p>Noradrenalin 10µg/ml</p> | <p>1 ml Noradrenalin (=1mg) blandes med 100ml isot. Glukose eller natriumklorid</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 10 µg/ml.</p> |
| <p>paracetamol</p> | <p>Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 10 mg/ml</p> |
| <p>Rocuronium</p> | <p>Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 10 mg/ml</p> |
| <p>Salbutamol (ventoline)</p> | <p>5 ml salbutamol (1mg/ml = 5mg) blandes i 45ml Natriumklorid eller isoton glucose.</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 0,1 mg/ml</p> |
| <p>Teofyllamin</p> | <p>20 ml (a 22 mmol/ml) = 440 mg blandes med 30 ml iso NaCl</p> <p>Koncentration af infusionsblanding bliver 8,8 mg/ml</p> |
| <p>Valproat (orfiril)</p> | <p>Bruges ufortyndet. Koncentration fra ampul 100 mg/ml</p> |