

Actioncard – observation efter COVID-19 vaccination

1. Vaccinerede skal observeres i mindst 15 min. Ved observation forstås, at der er en læge eller anden sundhedsfaglig person i umiddelbar nærhed af den vaccinerede, som kan reagere på evt. bivirkninger.
2. Vaccinerede anbefales at sidde eller ligge ned under observationsperioden.

Oversigt over akutte bivirkninger:

Tid fra vaccination	Bivirkning	Hypighed	Symptomer	Behandling
Straks - dage	Lokal reaktion	Ca. 80 %	Rødme, hævelse og ømhed ved indstiksted	Oftest ingen
Før – 15 minutter efter	Vasovagalt anfald	< 1-2 %	Utilpashed, svimmelhed, besvimelse, bleghed, lav puls, lavt blodtryk	Personen lægges ned, benene hæves
0 – 10 (15) min. efter	Anafylaktisk shock	< 0.01 %	Utilpashed, hævelse af slimhinder, vejrtrækningsbesvær, udslæt/rødme, hurtig puls, lavt blodtryk, evt. opkastning	Tilkald læge Giv adrenalin i.m. (se Actioncard "Anafylaktisk shock")

3. Evt. bivirkninger i observationsperioden skal indberettes (se Actioncard "Indberetning af bivirkninger")
4. Ved behov for vurdering af læge under observation på AAUH kontaktes infektionsmedicinsk læge (kode 88-701)
5. Ved spørgsmål / tvivl om ikke-akutte bivirkninger kontaktes infektionsmedicinsk bagvagt (kode 88-666 eller via omstillingen tlf. 97 66 00 00)