

Skema 2 og 3 - bilag til instruksen "Diabetes og kirurgi RHN"

Supplerende behandling med insulin/glukose		
<p>Ved BS < 5 eller > 11 suppleres med GIK-infusion med hhv. glukose eller hurtigtvirkende insulin. Der skal gå 2-4 timer mellem indgift af supplerende subcutan insulin. Insulin givet i.v. må gentages x 1/time.</p> <p>Bemærk: 10% glukose kræver PVK i stor vene</p>		
Aktuelle BS	Supplerende behandling	Efterfølgende intervention
< 5 mmol/l	1000 ml glukose 5 % iv. (indløbshastighed 100 ml/time). Sidedrop - Ingen insulin tilsat denne infusion. Ved BS < 3,5 mmol/l gives bolus 100 ml 10 % glukose iv.	BS måles hver halve time efter intervention. Fortsættes til BS er over 7 mmol/l
11-12 mmol/l	Suppler GIK-drop med 4 IE, hurtigtvirkende insulin sc. eller iv.	Vent 2 timer før der evt. gives sc. insulin igen. iv. insulin må gentages efter 1 time.
12,1 – 16 mmol/l	Suppler GIK-drop med 6 IE hurtigtvirkende insulin sc. eller iv	Vent 2 timer før der evt. gives sc. insulin igen. iv. insulin må gentages efter 1 time. Tjek for ketoner, se nedenfor.
16,1 – 30 mmol/l	Suppler GIK-drop med 10 IE hurtigtvirkende insulin sc. eller iv.	Kontakt medicinsk bagvagt og tjek for ketoner. Vent 2 timer før der evt. gives sc. insulin igen. iv. insulin må gentages efter 1 time.

Insulin Sliding Scale	
P-glukose (mmol/l)	Insulin sc.
< 12	ingen
≥ 12 og < 16	4 IE
≥16 og < 21	6 IE
≥ 21	8 IE