

Skema 4 - bilag til instruksen "Diabetes og kirurgi RHN"

Oversigt over antidiabetika og insulin*			
Perorale antidiabetika			
Alle perorale antidiabetika pauseres som udgangspunkt på operationsdagen. Kan genoptages postoperativt.			
Biguanid	Metformin	Øget perifer insulinfølsomhed, nedsat glukoseudskillelse fra leveren, hæmmer glukoseabsorption fra tarmen.	1. valg i medikamentel behandling af diabetes. Pauseres ved dehydratio og alvorlige infektionssygdomme. Kontraindikationer: akut nyresvigt, i.v. kontrast, tilstande med vævshypoxi, alkoholforgiftning.
SGLT2-hæmmere	-gliflozin Forxiga® Jardiance®	Øget glukoseudskillelse i urin. For effekt kræves normal nyrefunktion.	Undgå til ældre > 85 år, stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion, type 1 DM. Pauseres ved dehydratio og komplicerede urinvejsinfektioner.
DPP-4 hæmmere	-gliptin Trajenta® Januvia®	Øget insulinsekretion, nedsat glukoseudskillelse fra leveren.	Undgå ved pankreatit.
Sulfonylurea	Amaryl® Glimepirid®	Øget insulinsekretion	OBS! Risiko for hypoglykæmi! Undgå hos ældre, personer med faldrisiko og ved alkoholmisbrug.
Glitazoner	Actos®	Øget insulinfølsomhed	Bruges sjældent. Kontraindikation: lever- eller hjerteinsufficiens
S.c. injektionsbehandling			
GLP-1 analoger	Exenatid (Byetta®) Liraglutid (Victoza®) Trulicity®	Øget insulinsekretion, nedsat glukoseudskillelse fra leveren.	Undgå ved pankreatit.
Insulin			
Hurtigtvirkende	Actrapid®, Insuman Rapid®, Humulin Regular®, Novorapid®, Humalog® og Apidra®.	Præparaterne kan anvendes i ækvivalente doser.	
Intermediært virkende	Humulin®, Insulatard®		
Langtidsvirkende	Lantus®, Levemir®		
* For uddybende information henvises til pro.medicin.dk samt nedenstående PRI antidiabetika oversigt: https://pri.rm.dk/Sider/6859.aspx			