

Ordinerende læge

Har du afstemt flowchartet med FMK-doserne? *

Ja

↳ Dato: / - 20

Initialer: _____

* Ved ændret dosis overstreges standard doser



PERSONALE-
MATERIALE

Hjemmesygeplejerske


Har du tjekket, at flowchart-doserne er identiske med FMK-doserne for din patient?

Ja

↳ Dato: / - 20

Initialer: _____

FLOWCHART FOR MEDICINGIVNING



Morfin-doser

Ved svære eller moderate symptomer:

Giv sc Morfin 10 mg (ved rettet dosis: ____ mg)

Ved milde symptomer eller ved ubehag af stor dosis tidligere:

Giv sc Morfin 5 mg (ved rettet dosis: ____ mg)

Morfin har en forventet varighed på flere timer

Midazolam-doser

Ved svære eller moderate symptomer:

Giv sc Midazolam 2.5 mg (ved rettet dosis: ____ mg)

Ved milde symptomer:

Giv sc Midazolam 2.5 mg (ved rettet dosis: ____ mg)

Midazolam har en forventet varighed på flere timer

Vurdér effekt efter 20 minutter
(10 minutter hvis patienten er forpint)

Ikke god nok effekt

Forpint patient: Øg dosis straks til det dobbelte

Ikke forpint patient: Gentag dosis og ved næste dosering start med den samlede effektive dosis (f.eks. ved 10 mg + 10 mg: 20 mg som start ved næste dosis)

Ved tvivl eller manglende lindrende effekt hos din patient inden for 60 min, ring til patientens egen læge (vagtlæge uden for åbningstid) for rådgivning.

God effekt

Planlæg næste dosis

* Ved tvivl om doser i dette flowchart, se FMK.
FMK er altid retvisende for doser.