

Lungemedicinsk afdeling

AALBORG SYGEHUS
ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Selvbehandlingsplan for bronkietasi

Oplever du øget hoste og opspyt samt almen sygdomsfornemmelse, er der behov for, at du starter yderligere behandling. Du skal derfor tage den medicin, som vi har beskrevet her på bagsiden.

Inden du begynder at tage medicinen, skal du lave en opspytprøve fra lungerne, som du skal sende ind til os.

Lungemedicinsk Afdeling
Aalborg Sygehus
Mølleparkvej 4
9100 Aalborg
Tlf.: 9932 6400

www.aalborgsygehus.rn.dk



REGION NORDJYLLAND

Juli 2010

Lægens navn & dato

BEHANDLINGSPLAN

Navn på medicin	Antal	Antal dage
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Kontakt din læge

Hvis dine symptomer forværres efter du er begyndt på behandlingen, skal du kontakte din læge. Det gælder også, hvis du ikke har fået det bedre, når du har taget medicinen i to døgn.

Vi ringer, hvis der er ændringer

Når vi har analyseret den opspytprøve, du har sendt ind til os, kontakter vi dig, hvis der er behov for at ændre i den behand-

ling, som er beskrevet her. Er der ikke behov for at ændre behandlingen, hører du ikke fra os. Så skal du bare forsætte med at tage medicinen som beskrevet.

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger på bagsiden af denne pjece.