

BLØDNING POST PARTUM – ACTIONCARD - OPVÅGNINGEN

Dato for godkendelse: 1. februar 2022

Faglig ansvarlig: Kristine Nielsen

BLØDNING POST PARTUM – ACTIONCARD - OPVÅGNINGEN

Ved akut blødning over 500 ml og/ eller påvirket patient:

Kald obst. bagvagt 50576

Kald jordemoder 50070

Ved større blødning (over 1000 ml) – kald også anæstesilæge **50446**

Find blødningskasse i gyn. køleskab i medicinrummet.

Sikr at der er 2 velfungerende PVK. Sæt evt. 1 L NaCl op.

Læge eller jordemoder varetager/ordinerer følgende:

- Uterus holdes/kugles
- Blødning vurderes – det blå stykke (70 gram) vejes med blødning
- Lejres i Trendelenburg leje
- Ilt på maske
- BT og puls hver 5. minut.
- 1 el. 2 l NaCl eller Ringer-laktat



Følgende medicin kan ordineres:

- Koncentreret oxytocindrop: 10 ie oxytocin (1 ml) i 100 ml NaCl
- Ved manglende effekt: Oxytocindrop: 1 l NaCl med 40 IE (4 ampuller af 1 ml). Indløb med 100 ml/time. (obs max døgndosis oxytocin 40 IE)
- Methergin 0,2 mg im (1 ml) Kan gentages x 2. Obs ved præeclampi/hypertension.
- Tranexamsyre 1 gram iv (2 ampuller = 10 ml) – gives langsomt over et - to minutter.
- Prostifenem 0,25 mg im (1 ml) Kan gentages hvert 15. minut – max x 8. Kan evt. gives af bagvagt direkte i uterus.
- Cytotec 0,2 mg – 2 tabletter rectalt.

Der kan ordineres blodprøver f.eks. BAC/ BF test, blødningspakke el. Hgb. eller andre.

Ved behov for akut OP procedure:

Meld BLØDNING GRAD 1 på tlf. 50112.

Obs. Omsorg til far – evt. Information, stol, drikkevarer etc.

Husk: Tydelig og klar kommunikation. Meld tilbage når ordination er udført.

