

Actioncard ved hjertestop - Aalborg UH

Portør

1. Hvis ingen andre er til stede: Start basal genoplivning

(se bagside)

2. Hvis hjertestopbehandling er påbegyndt overtages hjertemassage
 - a. Hvis patienten ikke er intuberet:
30 kompressioner/2 indblæsninger
 - b. Hvis patienten er intuberet gives kontinuerlig hjertemassage med en frekvens på 100-120 kompressioner/minut. Dybde 5-6 cm.
3. Ved alle CPS kald henter en portør LUCAS inkl. ekstra batteri i modtagelsen, herefter ansvarlig for;
 - a. At påsætte og aftage LUCAS
 - b. Løbende kontrol af batteri og evt skift heraf
 - c. Styring (tænd/sluk af kompressioner), aftales evt fra gang til grundet mange personer om lejet

Der kan i særlige hjertestopsituationer være behov for at der afhentes og påsættes LUCAS til brug rundt i huset.

Ved hjertestop i modtagelsen har personalet i modtagelsen ansvaret for brugen af LUCAS.

Basal genoplivning

Trinvis førstehjælp til bevidstløse

1. Trækker den bevidstløse vejret?
 - Hvis ja: Bliv hos patienten og afvent assistance
 - Hvis nej: Sørg for frie luftveje - undersøg herefter om der er normal respiration
 - Hvis ja: Vedligehold frie luftveje, giv 100 % ilt
 - Hvis nej: Påbegynd hjertemassage med 30 kompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger (30/2), som fortsættes indtil hjertestopholdet ankommer
 - Hastighed: 100-120 kompressioner/minut. Dybde 5-6 cm.
 - Påmonter hjertestarter så snart det er muligt
 - Fortsæt basal genoplivning i henhold til hjertestarterens instrukser
2. Hvis der er puls - fortsæt med ventilation