

Nimoralskema

I forbindelse med din behandling, får du udleveret Nimoraltabletter. Tabletterne skal indtages 1½ time (90 minutter) før hver strålebehandling.

Stråleterapeuten vil dagligt påføre tidspunktet på, hvornår du skal tage tabletterne, og hvornår behandlingen er påbegyndt.

Det er *vigtigt*, at du *dagligt medbringer skemaet* og afleverer det til behandlingspersonalet inden hver strålebehandling. Tabletterne skal kun tages på de dage, hvor du skal have strålebehandling. Du kan tale med en stråleterapeut, hvis du er i tvivl om noget.

Dato														
Antal tabletter														
Taget kl.														
Behandlet kl.														
Bemærkninger														

Dato														
Antal tabletter														
Tages kl.														
Behandlet kl.														
Bemærkninger														

Dato														
Antal tabletter														
Tages kl.														
Behandlet kl.														
Bemærkninger														

Label:

Højde..... Vægt..... Overfladeareal.....

Antal tabletter til første daglige beh.:.....

Antal tabletter til anden daglige beh.:.....

Læge underskrift/dato.....

Vend venligst

Dato														
Antal tabletter														
Tages kl.														
Behandlet kl.														
Bemærkninger														

Nimoral (Nimorazol)

Hvad er Nimoral?

Nimoral er et præparat, der gør kræftcellerne mere følsomme overfor strålebehandling.

Hvordan skal man tage Nimoral?

Du skal tage tabletterne 1½ time (90 min) før din daglige strålebehandling.

Tabletterne kan synkes hele, knuses eller opløses i vand. Tabletterne skal opløses med 50 ml. vand pr. styk.

Hvilke bivirkninger kan opstå?

Du kan få kvalme og opkastning.

Du kan få hududslæt.

Kort tid efter du har taget Nimoral kan du opleve en følelse af varme og utilpashed.

Nimoral kan i enkelte tilfælde have til en Antabus-lignende virkning (kvalme, hovedpine, hjertebanken,...) ved indtagelse af alkohol. Indtagelse af alkohol bør undgås indtil seks timer efter tabletterne er taget.

Vi vil bede dig om at kontakte personalet, hvis du får bivirkninger.

Hvordan skal man opbevare Nimoral?

Opbevares ved stuetemperatur.

Bemærk!

Hvis du får blodfortyndende medicin (Maravan eller Marcoumar) skal du være opmærksom på, at virkningen af denne medicin forstærkes, sådan at du sandsynligvis skal have en mindre dosis.

Husk derfor at fortælle, hvis du får blodfortyndende medicin.