

## Til patienter med udsivning af røntgenkontraststof under huden

Dato for undersøgelsen

**Klinik Diagnostik  
Radiologisk Afdeling**

---

Du har desværre oplevet, at der i forbindelse med indsprøjtning af røntgenkontraststof i en blodåre, er sket en udsivning af noget af kontrasten.

Man kan ikke helt undgå denne situation, men vi bestræber os på at gøre risikoen så lille som mulig.

Du vil opleve en lokal gene i form af smerte, hævelse og rødme. Du kan gøre generne mindre ved at tage smertestillende medicin. Derudover kan man ved store hævelser holde armen opad og behandle med kolde omslag. Her kan man f.eks. bruge en pakke frosne grønsager, eller en pose is, pakket ind et håndklæde.

**Man må aldrig bruge is eller lignende direkte på huden.**

Hvis du skulle opleve en ændring i generne ved indstiksstedet, så som:

- Forværring af smerten
- Smerten flytter sig
- Der kommer føleforstyrrelser
- Der kommer store smerter ved bevægelse af fingrene

Skal du hurtigst muligt søge lægehjælp, og helst medbringe dette brev.

Personalet i Radiologisk Afdeling beklager de gener du måtte få i forbindelse med din undersøgelse.

Med venlig hilsen  
Personalet i Radiologisk Afdeling

Hobrovej 18-22  
Postboks 365  
9000 Aalborg  
Tlf.: 97 66 52 00  
Fax: 97 66 52 44  
Radiologiskafd.aalborgsygehus  
@m.dk

**Januar 2018**  
Udarbejdet af CT gruppen  
Faglig ansvarlig:  
Karin Lundgaard Bjerg

