

Vurdering:

1. Vurder om melding om allergi kan tilskrives en bivirkning (rådfør evt. produktresumé)
2. Tjek patientens beskrivelse/symptomer i henhold til nedenstående skema og ager i henhold til instruktionerne i højre kolonne

Beskrivelse/symptom	Instruktion
Symptomer opstået ved førstegangs eksponering til opioid	Jf. punkt B
Kløe, rødmen eller udslæt	Jf. punkt B
Alvorlig hypotension	Jf. punkt C
Hudreaktioner forskellig fra kløe, rødmen eller udslæt (f.eks. nældefeber)	Jf. punkt C
Vejtrækningsbesvær, besvær med at tale eller at synke	Jf. punkt C
Hævelse af ansigt, læber, mund, tunge, pharynx eller larynx	Jf. punkt C

Valg af alternativ:

- A. Hvis alt tyder på, at patients reaktion kan tilskrives bivirkninger er valgmulighederne:
 - i. Symptomatisk behandling (kvalmestillende, antihistamin osv.)
 - ii. Dosisjustering evt. seponering
 - iii. Afprøv evt. andet opioid og overvej anvendelse af non-opioid som smertestillende
- B. Hvis symptomerne tyder på pseudoallergi, er valgmulighederne:
 - i. Anvend evt. non-opioid som smertestillende
 - ii. Vælg et mere potent opioid med mindre udtalt afgivelse af histamin jf. tabel 1
 - iii. Suppler evt. med antihistamin H1- (eks. cetirizin) eller H2-blokker (eks. ranitidin)
 - iv. Evt. dosisreduktion

Opioid	Relativ histamin frigivelse
Codein	Høj
Morfin	Høj
Oxycodon	Lav
Hydromorphon	Lav
Fentanyl	Lav
Remifentanil, alfentanil og sufentanil	Frigiver ikke histamin

Faldende risiko for

Tabel 1: Tabellen angiver faldende relativ risiko for histaminfrigivelse

- C. Hvis symptomerne tyder på ægte allergi er valgmulighederne:
 - i. Anvend evt. non-opioid som smertestillende
 - ii. Afprøv opioid fra en anden kemisk gruppe end det patienten reagerer på jf. fig. 2




Fig. 2: Opdeling af opioider efter kemisk struktur og bindingssteder til IgE-antistoffer.