

Actioncard – Fitbone - opvågning

Beskrivelse

Fitbone anlæggelse/fjernelse - postoperativ observation

Operationsstuen kontaktes i god tid mhp. ordination af pumper til postoperativ smertebehandling. Pumperne kan med fordel blandes efter ordination af anæstesi-læge, inden patienten ankommer til opvågningen.

Efter aftale tilbyder opvågningen at blærescanne børn og unge på operationsafsnittet inden anæstesiens ophør.

Evt. behov for engangskateterisation varetages af operationspersonalet.

Modtagelse jf. PRI: [Patientbehandling i opvågningsafsnittet](#)

Vær særlig opmærksom på:

- Temperaturmåling – obs shivering
- Blærefyldning - blærescanning, SIK > 400ml
- Måling af omkreds ved læg og lår; som min. ved opv. start/slut. Afmærk på forbindingen, hvor målingen foretages. Se PRI: [Akut compartmentsyndrom](#)
- Forbindingen tilses – også under cryocuffen
- Cryocuffen tilsluttes 20 minutter hver time.
- Fryseelementerne skiftes, hvis de ikke er frosne.
- Vandstanden i beholderen efterfyldes ved behov, indtil afmærkningen.
- Placering af katetre til smerteblokade
- Virkningen/udbredelsen af blokaden i forhold til sensibilitet og bevægelighed
- Patienten må normalt ikke mobiliseres det første døgn
- Forventet opvågningstid 3-5 timer

Vanlig afslutning jf. PRI: [Patientbehandling i opvågningsafsnittet](#)